

# Gastroentérite virale non Norovirus ni Sapovirus ni Rotavirus



Mise à jour  
07/11/2024

Autres dénominations

Adénovirus

Entérovirus

Astrovirus

Informations relatives à  
Ambulances et transporteurs

## Epidémiologie

### Agent infectieux

Nombreux agents dont: Adénovirus, Enterovirus (Coxsackie, Echovirus), Astrovirus

---

## Réservoir

Homme

---

## Mode de transmission

- Dans la communauté: essentiellement par la nourriture, éventuellement par la consommation d'eau contaminée



A l'hôpital: par contact direct ou indirect avec du matériel contaminé

---

## Période d'incubation

Quelques heures à quelques jours

---

## Durée d'infectiosité

Tant que l'agent infectieux est présent, en principe quelques jours

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles

L'application des Précautions Standard est suffisante

---

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

### Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydro-alcoolique (PHA)

---

## Lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Mesures complémentaires

Le personnel atteint de gastroentérite virale doit être mis en arrêt de travail jusqu'à disparition des symptômes

---

## Nettoyage/désinfection

### lit et literie

- Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
  - Utiliser les sacs à linge usuels
  - A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient, désinfecter le lit et changer la literie
- 

### Environnement

- S'assurer de l'efficacité du produit désinfectant contre le pathogène en question
  - Lors de la levée des mesures ou au départ du patient :
    - Tout le matériel non-désinfectable présent en chambre est jeté
    - Tout le matériel désinfectable présent en chambre est désinfecté ou retraité
-

# Déchets

Élimination des déchets selon les filières habituelles

---