

Gonorrhée

Mise à jour
12/11/2024Autres dénominations
Neisseria GonorrhoeaeInformations relatives à
Cabinets et polycliniques / Médical

Epidémiologie

Agent infectieux

Neisseria gonorrhoeae

Réservoir

Homme

Mode de transmission

-  Principalement par contact sexuel
-  Transmission verticale mère-enfant



Matériel infectieux: liquides biologiques, particulièrement les sécrétions vaginales et urétrales, les sécrétions oculaires

Période d'incubation

1 à 14 jours, parfois plus long

Durée d'infectiosité



Quelques heures après une antibiothérapie adéquate



Pendant des mois chez l'individu non traité

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

L'application des Précautions Standard est suffisante

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydro-alcoolique (PHA)

Gants



Non indiqués en systématique



A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

Blouse de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Masque de soins

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Nettoyage et désinfection

Matériel de soins



Dispositifs médicaux a usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque



Vaisselle : filière habituelle

Déclaration du cas

Déclaration au médecin cantonal

Déclaration du médecin dans un délai de 1 semaine
