HPCi | hygiène, prévention et contrôle de l'infection

Gonorrhée

PS

Mise à jour
12/11/2024

Autres dénominations
Neisseria Gonorrhoeae

Informations relatives à
Cabinets et polycliniques / Dentaire

Epidémiologie

Agent infectieux

- *Neisseria gonorrhoeae*

Réservoir

- Homme

Mode de transmission

- Principalement par contact sexuel
- Transmission verticale mère-enfant

- Matériel infectieux: liquides biologiques, particulièrement les sécrétions vaginales et urétrales, les sécrétions oculaires

Période d'incubation

- 1 à 14 jours, parfois plus long

Durée d'infectiosité

- Quelques heures après une antibiothérapie adéquate
- Pendant des mois chez l'individu non traité

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

- L'application des Précautions Standard est suffisante

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

- Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydroalcoolique

Gants

- Non indiqué en systématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

Blouse de protection

- Non indiqué en systématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (Si risque de projection de liquides biologiques)

Masque de soins

- Non indiqué en systématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (risque de projection de liquides biologiques ou lors de symptômes respiratoires)

Nettoyage et désinfection

Matériel de soins

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel
- Dispositifs médicaux à usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque

Déclaration du cas

Déclaration au médecin cantonal

Déclaration du médecin dans un délai de 1 semaine