

# Hépatite A



Mise à jour  
12/11/2024

Informations relatives à  
Cabinets et polycliniques / Dentaire

## Epidémiologie

## Agent infectieux

Virus de l'Hépatite A (virus ARN)

---

## Réservoir

Homme

---

## Mode de transmission



Dans la communauté: par l'eau ou par les aliments contaminés, par contact direct



A l'hôpital: par contact direct avec les selles ou avec du matériel contaminé

---

## Période d'incubation

Dépend de la dose infectante, 15 à 50 jours, en moyenne 28 à 30 jours

---

## Durée d'infectiosité

Dès la deuxième moitié de la période d'incubation et jusqu'à quelques jours après le début de l'ictère

---

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Précautions Standard + Mesures additionnelles

L'application des Précautions Standard est suffisante

---

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

### Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydro-alcoolique (PHA)

---

### Gants



Non indiqués en systématique



A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

---

## Blouse de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Masque de soins

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Mesures complémentaires



Vaccination du personnel porteur d'hépatite C



Vaccination du personnel des laboratoires de microbiologie



Vaccination du personnel dans les régions à haute endémie ou lors d'épidémie

---

## Nettoyage et désinfection

## Matériel de soins

- Dispositifs médicaux a usage multiple: utiliser le détergent/désinfectant usuel
  - Vaisselle : filière habituelle
- 

## Lit et literie

- Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
  - Utiliser les sacs à linge usuels
  - Si Mesures Additionnelles:
    - A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient, désinfecter le lit et changer la literie
- 

## Environnement

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
  - Si Mesures Additionnelles:
    - A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient:
      - Désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient (table de nuit, statif, perfusomat, etc.)
      - Idéalement, changement de rideau de separation a la sortie du patient
  - Si paravent: nettoyage au quotidien
- 

## Déclaration du cas

# Déclaration au médecin cantonal

Déclaration du médecin dans un délai de 1 semaine

---