

# Hépatite C



Mise à jour  
12/11/2024

Informations relatives à  
Hôpitaux FHV, Cliniques, CTR / Bloc opératoire

## Epidémiologie

### Agent infectieux

Virus de l'hépatite C (virus ARN)

---

### Réservoir

Homme

---

### Mode de transmission

- Principalement par voie parentérale (utilisation d'aiguilles ou de matériel souillés, blessure accidentelle),
  - Autres modes plus rares (transmission verticale, transmission sexuelle)
-

## Période d'incubation

De 2 semaines à 6 mois, en moyenne entre 6 et 9 semaines

---

## Durée d'infectiosité

Débute 1 à 2 semaines avant les symptômes et peut persister à vie en l'absence de traitement lors d'infection chronique

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles

- L'application des Précautions Standard est suffisante
  - Instaurer des Mesures Additionnelles CONTACT :
    - si risque hémorragique important
    - lors des séances d'hémodialyse
- 

## Placement

Chambre individuelle si mesures additionnelles CONTACT

---

## Durée des mesures

Si Mesures Additionnelles, à maintenir jusqu'à disparition du risque hémorragique important

---

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

### Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydro-alcoolique (PHA)

---

### Gants

-  Non indiqués en systématique
  -  A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)
- 

### Blouse de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

### Masque de soins

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Mesures complémentaires

Toute exposition accidentelle à du sang ou des liquides biologiques doit être déclarée à la médecine du personnel

---

## Nettoyage et désinfection

### Matériel de soins

- Dispositifs médicaux a usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque
  - Vaisselle : filière habituelle
- 

### Lit et literie

- Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
  - Utiliser les sacs à linge usuels
- 

### Environnement

Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien

---

## Déchets

Elimination des déchets selon les filières habituelles

---

## Déclaration du cas

### Déclaration au service HPCI

Oui

---

## Déclaration au médecin cantonal

Déclaration du médecin dans un délai de 1 semaine

---