

Hépatite C



Mise à jour
12/11/2024

Informations relatives à
Hôpitaux FHV, Cliniques, CTR / Pédiatrie

Epidémiologie

Agent infectieux

Virus de l'hépatite C (virus ARN)

Réservoir

Homme

Mode de transmission

 Principalement par voie parentérale (utilisation d'aiguilles ou de matériel souillés, blessure accidentelle),

 Autres modes plus rares (transmission verticale, transmission sexuelle)

Période d'incubation

De 2 semaines à 6 mois, en moyenne entre 6 et 9 semaines

Durée d'infectiosité

Début 1 à 2 semaines avant les symptômes et peut persister à vie en l'absence de traitement lors d'infection chronique

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

-  L'application des Précautions Standard est suffisante
 -  Instaurer des Mesures Additionnelles CONTACT :
 -  si risque hémorragique important
 -  lors des séances d'hémodialyse
-

Placement

Chambre individuelle si mesures additionnelles CONTACT

Durée des mesures

Si Mesures Additionnelles, à maintenir jusqu'à disparition du risque hémorragique important

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Gants



Non indiqués en systématique



A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

Blouse de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Masque de soins

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Mesures complémentaires

Toute exposition accidentelle à du sang ou des liquides biologiques doit être déclarée à la médecine du personnel

Nettoyage et désinfection

Matériel de soins

-  Dispositifs médicaux à usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque
 -  Vaisselle : filière habituelle
-

Lit et literie

-  Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
 -  Utiliser les sacs à linge usuels
-

Environnement

Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien

Déchets

Déclaration du cas

Déclaration au service HPCI

Oui

Déclaration au médecin cantonal

Déclaration du médecin dans un délai de 1 semaine
