

# Hépatite C



Mise à jour  
12/11/2024

Informations relatives à  
Hôpitaux FHV, Cliniques, CTR / Soins intensifs

## Epidémiologie

## Agent infectieux

Virus de l'hépatite C (virus ARN)

---

## Réservoir

Homme

---

## Mode de transmission



Principalement par voie parentérale (utilisation d'aiguilles ou de matériel souillés, blessure accidentelle),



Autres modes plus rares (transmission verticale, transmission sexuelle)

---

## Période d'incubation

De 2 semaines à 6 mois, en moyenne entre 6 et 9 semaines

---

## Durée d'infectiosité

Début 1 à 2 semaines avant les symptômes et peut persister à vie en l'absence de traitement lors d'infection chronique

---

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles

-  L'application des Précautions Standard est suffisante
  -  Instaurer des Mesures Additionnelles CONTACT :
    -  si risque hémorragique important
    -  lors des séances d'hémodialyse
- 

## Placement

Chambre individuelle si mesures additionnelles CONTACT

---

## Durée des mesures

Si Mesures Additionnelles, à maintenir jusqu'à disparition du risque hémorragique important

---

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

### Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydro-alcoolique (PHA)

---

### Gants



Non indiqués en systématique



A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

---

### Blouse de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

### Masque de soins

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Mesures complémentaires

Toute exposition accidentelle à du sang ou des liquides biologiques doit être déclarée à la médecine du personnel

---

## Nettoyage et désinfection

### Matériel de soins

-  Dispositifs médicaux à usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque
  -  Vaisselle : filière habituelle
- 

### Lit et literie

-  Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
  -  Utiliser les sacs à linge usuels
- 

## Environnement

Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien

---

## Déchets

Elimination des déchets selon les filières habituelles

---

## Déclaration du cas

### Déclaration au service HPCI

Oui

---

### Déclaration au médecin cantonal

Déclaration du médecin dans un délai de 1 semaine

---