

# Herpès simplex néonatal



Mise à jour  
12/11/2024

Informations relatives à  
Hôpitaux FHV, Cliniques, CTR / Bloc opératoire

## Epidémiologie

## Agent infectieux

Virus herpes simplex de type 1 ou 2

---

## Réservoir

Homme

---

## Mode de transmission



Lors d'accouchement par voie basse



Plus rarement in utero ou post partum

---

## Période d'incubation

2 à 12 jours

---

## Durée d'infectiosité

Jusqu'à 7 semaines après la guérison apparente en cas de primo-infection

---

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles

Mesures Additionnelles CONTACT

---

## Placement

Chambre individuelle

---

## Signalétique

Affiche sur la porte à l'extérieur de la chambre  
Blouses devant la chambre  
Aux soins intensifs/continus, en absence de box disponible, délimiter avec du ruban adhésif le périmètre d'isolement  
Avant intervention chirurgicale, communiquer au bloc opératoire les Mesures Additionnelles

---

## Matériel de soins

Réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles  
Privilégier le matériel à usage unique

---

## Transport

Literie et chemise du patient propres  
Désinfection du lit/incubateur  
Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates  
Limiter les déplacements aux besoins essentiels

---

## Visiteurs

Ne pas s'asseoir sur le lit  
Désinfection des mains en sortant de la chambre

---

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

### Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydro-alcoolique (PHA)

---

### Gants



Non indiqués en systématique



A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

---

## Blouse de protection

Oui, si contact direct avec le patient ou son environnement immédiat, pas nécessaire si simple passage dans la chambre

---

## Masque de soins

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Nettoyage/désinfection

### Matériel de soins



Dispositifs médicaux a usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque



Vaisselle : filière habituelle

---

## Lit et literie

- Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
  - Utiliser les sacs à linge usuels
  - A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient, désinfecter le lit et changer la literie
- 

## Environnement

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
  - A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient:
  - Désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient (table de nuit, statif, perfusomat, etc.)
  - Idéalement, changement de rideau de separation a la sortie du patient
  - Si paravent: nettoyage au quotidien
- 

## Déchets

Elimination des déchets selon les filières habituelles

---

## Déclaration du cas

## Déclaration au service HPCI

Oui

---

