

# Herpès simplex néonatal



Mise à jour  
12/11/2024

Informations relatives à  
Cabinets et polycliniques / Médical

## Epidémiologie

## Agent infectieux

Virus herpes simplex de type 1 ou 2

---

## Réservoir

Homme

---

## Mode de transmission

-  Lors d'accouchement par voie basse
  -  Plus rarement in utero ou post partum
-

## Période d'incubation

2 à 12 jours

---

## Durée d'infectiosité

Jusqu'à 7 semaines après la guérison apparente en cas de primo-infection

---

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles

Mesures Additionnelles CONTACT

---

## Matériel de soins

Réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles  
Privilégier le matériel à usage unique

---

## Transport

Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates

---

# Mesures de protection/prévention pour le personnel

## Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydro-alcoolique (PHA)

---

## Gants



Non indiqués en systématique



A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

---

## Blouse de protection

Oui, lors de soins avec contact peau à peau ou si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Pas nécessaire pour un simple passage en chambre ou lors de la consultation

---

## Masque de soins

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Nettoyage/désinfection

### Matériel de soins

-  Dispositifs médicaux a usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque
  -  Vaisselle : filière habituelle
- 

### Environnement

-  Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
  -  A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient:
  -  Désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient (table de nuit, statif, perfusomat, etc.)
  -  Idéalement, changement de rideau de separation a la sortie du patient
  -  Si paravent: nettoyage au quotidien
- 

### Déchets

Elimination des déchets selon les filières habituelles

---