HPCi | hygiène, prévention et contrôle de l'infection

Legionella pneumophila (légionellose)

Mise à jour
06/11/2026

Informations relatives à
Cabinets et polycliniques / Médical

Epidémiologie

Agent infectieux

- *Legionella pneumophila* (majorité des infections humaines), autres espèces de legionella

Réservoir

- Eau: réseaux d'eau chaude (25-45°C), douche, humidificateurs, condensateurs, tours de refroidissement, spas, piscines thermales, fontaines décoratives, eaux stagnantes

Mode de transmission

- Dans la communauté: inhalation d'aérosols ou aspiration d'eau contaminée (appareils de climatisations)

- A l'hôpital: aérosols d'eau contaminée, eau du réseau, ventilation, humidificateurs, appareils de physiothérapie respiratoire

Période d'incubation

- Maladie du légionnaire: 2 à 10 jours, le plus souvent 5 à 6 jours
- Fièvre de Pontiac: 5 à 72 heures

Durée d'infectiosité

- Pas de transmission interhumaine

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

- L'application des Précautions Standard est suffisante

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Gants

- Non indiqué en systématique

- A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

Blouse de protection

- Non indiqué en systématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (Si risque de projection de liquides biologiques)

Masque de soins

- Non indiqué en systématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (risque de projection de liquides biologiques ou lors de symptômes respiratoires)

Déclaration du cas

Déclaration au médecin cantonal

- Oui, utiliser le formulaire déclaration de résultats d'analyses cliniques : **Légionellose,** site OFSP
- A renvoyer au médecin cantonal dans un délai de 24h