

Lèpre

Mise à jour
13/11/2024Autres dénominations
*Mycobacterium Leprae*Informations relatives à
Hôpitaux FHV, Cliniques, CTR / Soins intensifs

Epidémiologie

Agent infectieux

Mycobacterium leprae

Réservoir

Homme

Mode de transmission

Probablement lors de contact étroit et prolongé avec des sécrétions nasales
d'une personne infectée

Pas de transmission si traitement adapté

Période d'incubation

De 9 mois à 20 ans, en moyenne 4 ans

Durée d'infectiosité

Jusqu'à quelques jours après le début d'un traitement

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

L'application des Précautions Standard est suffisante

Risque faible de transmission lors de contact étroit et prolongé avec une personne infectée et non traitée. En cas de doute instaurer des Mesures Additionnelles
Gouttelettes

Autre

Les personnes ayant vécu en contact étroit avec des patients lépreux doivent être examinés cliniquement. Cet examen doit être répété annuellement pendant 5 ans

Prise en charge des personnes contacts

Mesures



Les personnes ayant vécu en contact étroit avec des patients lépreux doivent être examinées cliniquement



Cet examen doit être répété annuellement pendant 5 ans

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydro-alcoolique (PHA)

Gants



Non indiqués en systématique



A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

Blouse de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Masque de soins



Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Lunettes de protection



Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Nettoyage et désinfection

Matériel de soins

-  Dispositifs médicaux a usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque
 -  Vaisselle : filière habituelle
-

Lit et literie

-  Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
 -  Utiliser les sacs à linge usuels
-

Environnement

Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien

Déchets

Déclaration du cas

Déclaration au service HPCI

Oui
