HPCi | hygiène, prévention et contrôle de l'infection

Lèpre

PS

Mise à jour
06/11/2026

Autres dénominations
Mycobacterium Leprae

Informations relatives à
Cabinets et polycliniques / Dentaire

Epidémiologie

Agent infectieux

- *Mycobacterium leprae*
- *Mycobacterium lepromatosis*

Réservoir

- Homme

Mode de transmission

- Probablement lors de contact étroit et prolongé avec des sécrétions nasales d'une personne infectée
- La transmission ne se fait pas lors de contacts occasionnels

- Pas de transmission si traitement adapté

Période d'incubation

- De 9 mois à 20 ans, en moyenne 4 ans

Durée d'infectiosité

- Jusqu'à quelques jours après le début d'un traitement

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

- L'application des Précautions Standard est suffisante

Prise en charge des personnes contacts

Mesures

- Les personnes ayant vécu en contact étroit avec des personnes atteintes de lèpre doivent être examinées cliniquement
- Cet examen doit être répété annuellement pendant 5 ans

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Gants

- Non indiqué en systématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

Blouse de protection

- Non indiqué en systématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (Si risque de projection de liquides biologiques)

Masque de soins

- Non indiqué en systématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (risque de projection de liquides biologiques ou lors de symptômes respiratoires)

Lunettes de protection

- Non indiqué en sytématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (risque de projection de liquides biologiques)