HPCi | hygiène, prévention et contrôle de l'infection

# Lèpre

PS

Mise à jour
06/11/2026

Autres dénominations
Mycobacterium Leprae

Informations relatives à
CHUV / Bloc opératoire

## Epidémiologie

### Agent infectieux

- *Mycobacterium leprae*
- *Mycobacterium lepromatosis*

### Réservoir

- Homme

### Mode de transmission

- Probablement lors de contact étroit et prolongé avec des sécrétions nasales d'une personne infectée
- La transmission ne se fait pas lors de contacts occasionnels

- Pas de transmission si traitement adapté

## Période d'incubation

- De 9 mois à 20 ans, en moyenne 4 ans

## Durée d'infectiosité

- Jusqu'à quelques jours après le début d'un traitement

# Prise en charge du cas positif/suspect

## Précautions Standard + Mesures Additionnelles

- Aucune, application des Précautions Standard

# Prise en charge des personnes contacts

## Mesures

- Les personnes ayant vécu en contact étroit avec des patients lépreux doivent être examinées cliniquement
- Cet examen doit être répété annuellement pendant 5 ans

# Mesures de protection/prévention pour le personnel

## Hygiène des mains

- Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique

## Gants

- Si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée

## Blouse de protection

- Si risque de projections de liquides biologiques

## Masque de soins

- Si risque de projections de liquides biologiques
- Lors de symptômes respiratoires

## Lunettes de protection

- Si risque de projections de liquides biologiques

# Nettoyage et désinfection

## Matériel de soins

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel
- Retraiter le matériel à usage multiple après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque

## Lit et literie

- Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
- Utiliser les sacs à linge usuels
- Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité

## Environnement

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
- Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour
- Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement

## Déchets

Elimination des déchets selon les filières habituelles