

Leptospirose

Mise à jour
13/11/2024

Informations relatives à
Cabinets et polycliniques / Dentaire

Epidémiologie

Agent infectieux

Leptospira species

Réservoir

-  Rats, souris, taupes, hérissons et autres mammifères, ainsi que bovins et porcs.
 -  Les animaux excrètent les leptospires dans les urines
-

Mode de transmission

-  Par contact de la peau lésée ou des muqueuses avec de la terre ou des déchets végétaux contaminés par de l'urine d'animaux infectés



Occasionnellement par ingestion d'eau ou d'aliments contaminés

Période d'incubation

2 à 30 jours, habituellement 5 à 14 jours

Durée d'infectiosité



Pas de transmission interhumaine.



Quelques cas de transmission au laboratoire

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

L'application des Précautions Standard est suffisante

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Gants



Non indiqués en systématique



A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

Blouse de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Masque de soins

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques
