HPCi | hygiène, prévention et contrôle de l'infection

# Leptospirose

Mise à jour
06/11/2026

Informations relatives à
Cabinets et polycliniques / Dentaire

## Epidémiologie

### Agent infectieux

- *Leptospira* species

### Réservoir

- Rats, souris, taupes, hérissons et autres mammifères, ainsi que bovins et porcs.
- Les animaux excrètent les leptospires dans les urines

### Mode de transmission

- Par contact de la peau lésée ou des muqueuses avec de la terre ou des déchets végétaux contaminés par de l'urine d'animaux infectés

- Occasionnellement par ingestion d'eau ou d'aliments contaminés

## Période d'incubation

- 2 à 30 jours, habituellement 5 à 14 jours

## Durée d'infectiosité

- Pas de transmission interhumaine.
- Quelques cas de transmission au laboratoire

# Prise en charge du cas positif/suspect

## Précautions Standard + Mesures Additionnelles

- L'application des Précautions Standard est suffisante

# Mesures de protection/prévention pour le personnel

## Gants

- Non indiqué en systématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

## Blouse de protection

- Non indiqué en systématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (risque de projection de liquides biologiques)

## Masque de soins

- Non indiqué en systématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (risque de projection de liquides biologiques ou lors de symptômes respiratoires)