HPCi | hygiène, prévention et contrôle de l'infection

Leptospirose

PS

Mise à jour
06/11/2026

Informations relatives à
CHUV / Dialyse

Epidémiologie

Agent infectieux

- *Leptospira* species

Réservoir

- Rats, souris, taupes, hérissons et autres mammifères, ainsi que bovins et porcs.
- Les animaux excrètent les leptospires dans les urines

Mode de transmission

- Par contact de la peau lésée ou des muqueuses avec de la terre ou des déchets végétaux contaminés par de l'urine d'animaux infectés

- Occasionnellement par ingestion d'eau ou d'aliments contaminés

Période d'incubation

- 2 à 30 jours, habituellement 5 à 14 jours

Durée d'infectiosité

- Pas de transmission interhumaine.
- Quelques cas de transmission au laboratoire

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

- Aucune, application des Précautions Standard

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

- Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique

Gants

- Si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée

Blouse de protection

- Si risque de projections de liquides biologiques

Masque de soins

- Si risque de projections de liquides biologiques
- Lors de symptômes respiratoires

Lunettes de protection

- Si risque de projections de liquides biologiques

Nettoyage et désinfection

Matériel de soins

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel

- Retraiter le matériel à usage multiple après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque

Lit et literie

- Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
- Utiliser les sacs à linge usuels
- Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité

Environnement

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
- Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour
- Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement

Déchets

- Elimination des déchets selon les filières habituelles