

Méningite Choriolymphocytaire

Mise à jour
13/11/2024Autres dénominations
ArenavirusInformations relatives à
CHUV / Soins intensifs

Epidémiologie

Agent infectieux

Arenavirus: lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV)

Réservoir

Rongeurs (souris, hamsters, cochons d'Inde)

Mode de transmission

Par inhalation de poussières ou par consommation d'aliments contaminés par l'urine de rongeurs

Période d'incubation

8 à 13 jours

Durée d'infectiosité

Pas de transmission interhumaine

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles



Aucune, application des Précautions Standard

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains



Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique

Gants



Si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée

Blouse de protection



Si risque de projections de liquides biologiques

Masque de soins



Si risque de projections de liquides biologiques



Lors de symptômes respiratoires

Lunettes de protection



Si risque de projections de liquides biologiques

Nettoyage et désinfection

Matériel de soins



Utiliser le détergent/désinfectant usuel



Retraiter le matériel à usage multiple après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque

Lit et literie

-  Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
 -  Utiliser les sacs à linge usuels
 -  Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité
-

Environnement

-  Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
 -  Utiliser les sacs à linge usuels
 -  Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité
-

Déchets

-  Elimination des déchets selon les filières habituelles
-