HPCi | hygiène, prévention et contrôle de l'infection

Mononucléose infectieuse

PS

Mise à jour
30/10/2026

Autres dénominations
Epstein-Barr Virus

Informations relatives à
Cabinets et polycliniques / Dentaire

Epidémiologie

Agent infectieux

- Virus Epstein-Barr

Réservoir

- Homme

Mode de transmission

- Dans la communauté: de personne à personne par la salive le plus souvent
- A l'hôpital: transfusion, transplantation

Période d'incubation

4 à 6 semaines

Durée d'infectiosité

Le virus peut être retrouvé dans les sécrétions oro-pharyngées jusqu'à un an après la maladie

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

L'application des Précautions Standard est suffisante

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Gants

Non indiqué en systématique

A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

Blouse de protection

Non indiqué en systématique

- A porter selon les indications des Précautions Standard (Si risque de projection de liquides biologiques)

Masque de soins

- Non indiqué en systématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (risque de projection de liquides biologiques ou lors de symptômes respiratoires)