

Paludisme, Malaria - CHUV

Mise à jour
24/11/2017Autres dénominations
Plasmodium
MalariaInformations relatives à
CHUV / Toutes spécialités

Epidémiologie

Agent infectieux

Plasmodium falciparum, P.vivax, P. ovale, P. malariae, P. knowlesi

Réservoir

Homme

Mode de transmission



par piqûre d'un moustique anophèle femelle infecté

Période d'incubation



P. falciparum: 9 à 14 jours



P. vivax et *P. ovale*: 12 et 18 jours, parfois plusieurs mois (*P. vivax*)



P. malariae: 18 à 40 jours

Durée d'infectiosité

Pas de transmission interhumaine. Le plasmodium peut être transmis par transfusion ou par des aiguilles souillées (anecdotique)

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles



Aucune, application des Précautions Standard

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains



Hygiène des mains selon les 5 indications de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique

Gants



Si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée

Blouse de protection



Si risque de projections de liquides biologiques

Masque



Si risque de projections de liquides biologiques



Lors de symptômes respiratoires

Lunettes de protection



Si risque de projections de liquides biologiques

Nettoyage et désinfection

Matériel de soins



Utiliser le détergent/désinfectant usuel

- Retraiter le matériel à usage multiple après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque
-

Lit et literie

- Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
 - Utiliser les sacs à linge usuels
 - Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité
-

Environnement

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
 - Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour
 - Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement
-

Déchets

- Elimination des déchets selon les filières habituelles
-

Déclaration du cas

Déclaration au médecin cantonal



Déclaration du médecin dans un délai de 1 semaine
