

Peste



Mise à jour
14/11/2024

Autres dénominations
Yersinia Pestis

Informations relatives à
Ambulances et transporteurs

Epidémiologie

Agent infectieux

Yersinia pestis

Réservoir

Rongeurs (la peste est endémique en ex-Union Soviétique, dans certains pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique)

Mode de transmission



Par contact direct avec des animaux infectés, éventuellement par morsure ou par gouttelettes



Par piqûre de puces infectées

Période d'incubation

- > Peste bubonique : 1 à 7 jours
 - > Peste pulmonaire : 1 à 4 jours
-

Durée d'infectiosité

- > Les puces infectées peuvent transmettre la maladie pendant des mois.
 - > Les patients ne sont plus infectieux 2 à 3 jours après le début du traitement
-

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

- > Peste cutanée (bubonique) :
 - > L'application des Précautions Standard est suffisante
 - > Peste pulmonaire:
 - > Mesures Additionnelles GOUTTELETTES
-

Placement

- > Peste pulmonaire
 - > Mise à l'écart dans l'attente de la consultation
 - > Si passage en salle d'attente, faire porter un masque au patient



Dans l'attente du transfert du patient en soins aigus, maintenir la porte de la salle de consultation fermée

Durée des mesures



Peste pulmonaire



Jusqu'à 3 jours après le début du traitement



Sans traitement 2 à 3 mois

Matériel de soins



Peste pulmonaire



Privilégier le matériel à usage unique (UU)



Prévoir un stock de matériel à UU pour 24h uniquement



Le matériel de soins est réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles

Transport



Peste pulmonaire



Port d'un masque de soins par le patient



Literie et vêtements du résident propres



Lors d'un transfert en cabinet médical ou à l'hôpital :



Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates



Limiter les déplacements aux besoins essentiels

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydro-alcoolique (PHA)

Gants



Non indiqués en systématique



A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

Blouse de protection



Si peste pulmonaire:



Oui, si contact direct avec le patient ou son environnement immédiat



Pas nécessaire pour un simple passage dans la chambre

Masque de soins



Si peste pulmonaire



Masque de soins lorsque le travail s'effectue dans un rayon de 1-2 mètres



Pas nécessaire pour un simple passage dans la chambre

Lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Mesures complémentaires

Vaccination pour le personnel impliqué dans la lutte contre la peste
Prophylaxie post-expositionnelle par doxycycline 100mg 2x7j pendant 7 jours pour le personnel ayant eu un contact non protégé avec un patient présentant une peste pulmonaire
Contacter la médecine du personnel

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins



Dispositifs médicaux a usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque



Vaisselle : filière habituelle

Lit et literie



Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre



Si les patients sont porteurs de puces (ou suspects), il faut procéder à un traitement par un insecticide efficace.



Les vêtements doivent être désinfectés ou éliminés



lavage à 60° des vêtements, sous-vêtements, linge de lit



mettre pendant 3 jours les effets personnels ne supportant pas une température de 60° dans un sac plastique fermé hermétiquement



si matelas et couverture sans draps: désinfection du lit avec un insecticide en poudre ou spray

Déchets

Elimination des déchets selon les filières habituelles

Déclaration du cas

Déclaration à HPCi Vaud

Oui

Déclaration au médecin cantonal

Déclaration du médecin par téléphone dans les 2 heures
