HPCi | hygiène, prévention et contrôle de l'infection

Pneumonie à Chlamydia du nouveau-né

PS

Mise à jour
14/11/2024

Autres dénominations
Chlamydia Trachomatis

Informations relatives à
Ambulances et transporteurs

Epidémiologie

Agent infectieux

Chlamydia trachomatis, sérotypes D à K

Réservoir

Homme

Mode de transmission

Transmission verticale mère-enfant lors d'accouchement

Période d'incubation

1 à 18 semaines après la naissance (le plus souvent 4 à 11 semaines)

Durée d'infectiosité

Inconnue

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

L'application des Précautions Standard est suffisante

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydroalcoolique

Gants

Non indiqué en systématique

- A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

Blouse de protection

- Non indiqué en systématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de projection de liquides biologiques)

Masque de soins

- Non indiqué en systématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de projection de liquides biologiques ou lors de symptômes respiratoires)

Lunettes de protection

- Non indiqué en sytématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de projection de liquides biologiques)

Nettoyage et désinfection

Matériel de soins

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel

- Dispositifs médicaux à usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque

Lit et literie

- Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
- Utiliser les sacs à linge usuels
- Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité

Déchets

- Elimination des déchets selon les filières habituelles