HPCi | hygiène, prévention et contrôle de l'infection

# Pneumonie à Chlamydia du nouveau-né

PS

Mise à jour
14/11/2024

Autres dénominations
Chlamydia Trachomatis

Informations relatives à
CHUV / Psychiatrie

## Epidémiologie

### Agent infectieux

*Chlamydia trachomatis*, sérotypes D à K

### Réservoir

Homme

### Mode de transmission

Transmission verticale mère-enfant lors d'accouchement

## Période d'incubation

1 à 18 semaines après la naissance (le plus souvent 4 à 11 semaines)

## Durée d'infectiosité

Inconnue

# Prise en charge du cas positif/suspect

## Précautions Standard + Mesures Additionnelles

Aucune, application des Précautions Standard

# Mesures de protection/prévention pour le personnel

## Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique

## Gants

Si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée

## Blouse de protection

- Si risque de projections de liquides biologiques

## Masque de soins

- Si risque de projections de liquides biologiques
- Lors de symptômes respiratoires

## Lunettes de protection

- Si risque de projections de liquides biologiques

# Nettoyage et désinfection

## Matériel de soins

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel
- Retraiter le matériel à usage multiple après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque

## Lit et literie

- Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre

- Utiliser les sacs à linge usuels
- Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité

## Environnement

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
- Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour
- Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement

## Déchets

- Elimination des déchets selon les filières habituelles