

Pneumonie à *Chlamydia pneumoniae*

Mise à jour
14/11/2024Autres dénominations
*Chlamydia Pneumoniae*Informations relatives à
EMS, EPSM, ESE, CAT

Epidémiologie

Agent infectieux

Chlamydia pneumoniae

Réservoir

Homme

Mode de transmission



Transmission personne à personne par les sécrétions respiratoires.



Contact Indirect

Période d'incubation

Le temps d'incubation est approximativement de 21 jours

Durée d'infectiosité

Inconnue, probablement pendant la durée de l'infection clinique

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

L'application des Précautions Standard est suffisante

Durée des mesures

Jusqu'à guérison clinique

Matériel de soins

Désinfection rigoureuse du matériel à usage multiple (stéthoscope, brassard à pressions, glucomètre, sатуromètre, etc)

Transport

- > Port d'un masque de soins pour le résident
 - > Literie et vêtements du résident propres
 - > Désinfection du lit
 - > Lors d'un transfert en cabinet médical ou à l'hôpital :
 - > Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates
-

Visiteurs

- > Port d'un masque de soins
 - > Ne pas s'asseoir sur le lit
 - > Désinfection des mains en sortant de la chambre
 - > Surblouse seulement si participation aux soins
-

Mesures en cas d'épidémie

- > Cohorte possible lors d'épidémie
 - > Se référer aux recommandations de l'unité HPCi
-

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

Gants



Non indiqués en systématique



A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

Blouse de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Masque de soins

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Nettoyage et désinfection

Matériel de soins



Dispositifs médicaux a usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque



Vaisselle : filière habituelle

Lit et literie



Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre



Utiliser les sacs à linge usuels

Environnement



Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien



Si paravent: nettoyage au quotidien

Déchets

Elimination des déchets selon les filières habituelles
