

Pneumonie à *Chlamydia pneumoniae*

Mise à jour
14/11/2024

Autres dénominations
Chlamydia Pneumoniae

Informations relatives à
Ambulances et transporteurs

Epidémiologie

Agent infectieux

Chlamydia pneumoniae

Réservoir

Homme

Période d'incubation

Le temps d'incubation est approximativement de 21 jours

Durée d'infectiosité

Inconnue, probablement pendant la durée de l'infection clinique

Prise en charge du cas positif/suspect

Placement

faire mettre un masque au patient lors de séjour en salle d'attente

Matériel de soins

Désinfection rigoureuse du matériel à usage multiple (stéthoscope, brassard à pressions, glucomètre, saturemètre, etc)

Transport

-  Port d'un masque de soins pour le résident
 -  Lors d'un transfert en cabinet médical ou à l'hôpital :
 -  Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates
-

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

Gants



Non indiqués en systématique



A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

Blouse de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Masque de soins

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Nettoyage et désinfection

Matériel de soins

 Dispositifs médicaux a usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque

 Vaisselle : filière habituelle

Lit et literie

 Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre

 Utiliser les sacs à linge usuels

Environnement

 Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien

 Si paravent: nettoyage au quotidien

Déchets

Elimination des déchets selon les filières habituelles
