HPCi | hygiène, prévention et contrôle de l'infection

Pneumonie à Chlamydia pneumoniae

PS

Mise à jour
30/10/2026

Autres dénominations
Chlamydia Pneumoniae

Informations relatives à
CHUV / Bloc opératoire

Epidémiologie

Agent infectieux

- *Chlamydia pneumoniae*

Réservoir

- Homme

Mode de transmission

- Mode et conditions de transmission mal connus (gouttelette?).
- Risque de transmission interhumaine faible, mais épidémies décrites

Période d'incubation

Inconnue, probablement 3 à 4 semaines

Durée d'infectiosité

Inconnue, probablement pendant la durée de l'infection clinique

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

Aucune, application des Précautions Standard

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique

Gants

Si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée

Blouse de protection

- Si risque de projections de liquides biologiques

Masque de soins

- Si risque de projections de liquides biologiques
- Lors de symptômes respiratoires

Lunettes de protection

- Aucune, application des Précautions Standard

Nettoyage et désinfection

Matériel de soins

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel
- Retraiter le matériel à usage multipe après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque

Lit et literie

- Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre

- Utiliser les sacs à linge usuels
- Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité

Environnement

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
- Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour
- Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement

Déchets

- Elimination des déchets selon les filières habituelles