

# Pneumonie à *Haemophilus influenzae*

Mise à jour  
31/01/2017Autres dénominations  
*Haemophilus Influenzae*Informations relatives à  
Hôpitaux FHV, Cliniques, CTR / Psychiatrie

## Epidémiologie

## Agent infectieux

*Haemophilus influenzae*

---

## Réservoir

Homme

---

## Mode de transmission

-  Transmission par des gouttelettes, particules de grosse dimension (> 5 microns) dont la production est exacerbée par la toux, la conversation ou certaines interventions: ex. bronchoscopie
-  La dispersion de gouttelettes se limite à un rayon de 1 à 2 mètres depuis la source
-  Les mains ou les gants contaminés par les gouttelettes peuvent aussi être un vecteur



Portes d'entrée: muqueuses (nez, gorge)

---

## Période d'incubation

Inconnue, probablement courte: max. 7 jours

---

## Durée d'infectiosité

24 heures après l'introduction d'un traitement antibiotique adéquat

---

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles



L'application des Précautions Standard est suffisante chez l'adulte

#### **Instaurer des Mesures Additionnelles GOUTTELETTES**



Chez les nourrissons et les jeunes enfants < 6 ans

---

## Placement

#### **Si Mesures Additionnelles Gouttelettes :**



Chambre individuelle ou isolement géographique



Cohortage possible (regroupement de plusieurs patients avec le même germe)

---

## Durée des mesures

### **Si Mesures Additionnelles Gouttelettes :**



Jusqu'à 24 heures après l'introduction d'un traitement antibiotique adéquat

---

## Suivi microbiologique



Pas nécessaire de faire un prélèvement de suivi sauf avis contraire HPCi

---

## Soins de base



En cas de douche commune, le patient en Mesures Additionnelles passe en dernier

---

## Matériel de soins



Le matériel de soins est réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles



Privilégier le matériel à usage unique

---

## Transport

### **Si Mesures Additionnelles Gouttelettes :**



Port d'un masque de soins par le patient et le transporteur

- > Vêtements propres
  - > Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates
  - > Limiter les déplacements pendant la durée de la maladie
- 

## Circulation

### Si Mesures Additionnelles Gouttelettes :

- > Sorties limitées à la physiothérapie de mobilisation et aux besoins essentiels. Lors d'hospitalisation prolongée et si patient compliant, possibilité de sorties au BH 08 ou à l'extérieur
  - > Masque de soins pour le patient et le soignant
  - > Surblouse et gants pas nécessaires pour le patient
  - > Surblouse indiquée pour le soignant seulement si contact direct avec le patient
- 

## Visiteurs

### Si Mesures Additionnelles Gouttelettes :

- > Port d'un masque de soins
  - > Ne pas s'asseoir sur le lit
  - > Désinfection des mains en sortant de la chambre
  - > Surblouse seulement si participation aux soins
- 

## Transfert/Sortie

### Si Mesures Additionnelles Gouttelettes :



Avertir le service/l'établissement de soins de destination

---

## Mesures en cas d'épidémie



Cohortage possible lors d'épidémie



Se référer aux recommandations de l'unité HPCi-CHUV

---

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

### Hygiène des mains



Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique

---

### Gants



Non indiqués en systématique



A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

---

### Blouse de protection



Si risque de projections de liquides biologiques



Ou si Mesures Additionnelles Gouttelettes (sauf si simple passage dans la chambre)

---

## Masque de soins



Oui, masque de soins lorsque le travail s'effectue dans un rayon de 1 à 2 mètres du patient

---

## Lunettes de protection



Non en systématique



A porter selon les indications des Précautions Standard (risque de projections de liquides biologiques)

---

## Nettoyage/désinfection

### Matériel de soins



Utiliser le détergent/désinfectant usuel



Retraiter le matériel à usage multiple après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque

---

### Lit et literie



Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre



Utiliser les sacs à linge usuels



Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité

---

## Environnement

-  Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
  -  Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour
  -  Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement
- 

## Déchets

-  Elimination des déchets selon les filières habituelles
-