

# Pneumonie à *Haemophilus influenzae*



Mise à jour  
31/01/2017

Autres dénominations  
*Haemophilus Influenzae*

Informations relatives à  
CHUV / Psychiatrie

## Epidémiologie

## Agent infectieux

*Haemophilus influenzae*

---

## Réservoir

Homme

---

## Mode de transmission



Transmission par des gouttelettes, particules de grosse dimension (> 5 microns) dont la production est exacerbée par la toux, la conversation ou certaines interventions: ex. bronchoscopie



La dispersion de gouttelettes se limite à un rayon de 1 à 2 mètres depuis la source



Les mains ou les gants contaminés par les gouttelettes peuvent aussi être un vecteur



Portes d'entrée: muqueuses (nez, gorge)

---

## Période d'incubation

Inconnue, probablement courte: max. 7 jours

---

## Durée d'infectiosité

24 heures après l'introduction d'un traitement antibiotique adéquat

---

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles



L'application des Précautions Standard est suffisante chez l'adulte

**Instaurer des Mesures Additionnelles GOUTTELETTES**



Chez les nourrissons et les jeunes enfants < 6 ans

---

## Placement

**Si Mesures Additionnelles Gouttelettes :**



Chambre individuelle ou isolement géographique



Cohortage possible (regroupement de plusieurs patients avec le même germe)

---

## Durée des mesures

### **Si Mesures Additionnelles Gouttelettes :**



Jusqu'à 24 heures après l'introduction d'un traitement antibiotique adéquat

---

## Suivi microbiologique



Pas nécessaire de faire un prélèvement de suivi sauf avis contraire HPCi

---

## Soins de base



En cas de douche commune, le patient en Mesures Additionnelles passe en dernier

---

## Matériel de soins



Le matériel de soins est réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles



Privilégier le matériel à usage unique

---

# Transport

## Si Mesures Additionnelles Gouttelettes :

-  Port d'un masque de soins par le patient et le transporteur
  -  Vêtements propres
  -  Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates
  -  Limiter les déplacements pendant la durée de la maladie
- 

# Circulation

## Si Mesures Additionnelles Gouttelettes :

-  Sorties limitées à la physiothérapie de mobilisation et aux besoins essentiels.  
Lors d'hospitalisation prolongée et si patient compliant, possibilité de sorties au BH 08 ou à l'extérieur
  -  Masque de soins pour le patient et le soignant
  -  Surblouse et gants pas nécessaires pour le patient
  -  Surblouse indiquée pour le soignant seulement si contact direct avec le patient
- 

# Visiteurs

## Si Mesures Additionnelles Gouttelettes :

-  Port d'un masque de soins
  -  Ne pas s'asseoir sur le lit
  -  Désinfection des mains en sortant de la chambre
  -  Surblouse seulement si participation aux soins
-

## Transfert/Sortie

### Si Mesures Additionnelles Gouttelettes :

-  Avertir le service/l'établissement de soins de destination
- 

## Mesures en cas d'épidémie

-  Cohortage possible lors d'épidémie
  -  Se référer aux recommandations de l'unité HPCi-CHUV
- 

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

### Hygiène des mains

-  Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique
- 

### Gants

-  Non indiqués en systématique
  -  A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)
-

## Blouse de protection

-  Si risque de projections de liquides biologiques
  -  Ou si Mesures Additionnelles Gouttelettes (sauf si simple passage dans la chambre)
- 

## Masque de soins

-  Oui, masque de soins lorsque le travail s'effectue dans un rayon de 1 à 2 mètres du patient
- 

## Lunettes de protection

-  Non en systématique
  -  A porter selon les indications des Précautions Standard (risque de projections de liquides biologiques)
- 

## Nettoyage/désinfection

### Matériel de soins

-  Utiliser le détergent/désinfectant usuel
  -  Retraiter le matériel à usage multiple après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque
-

## Lit et literie

-  Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
  -  Utiliser les sacs à linge usuels
  -  Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité
- 

## Environnement

-  Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
  -  Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour
  -  Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement
- 

## Déchets

-  Elimination des déchets selon les filières habituelles
-