HPCi | hygiène, prévention et contrôle de l'infection

Infection invasive à pneumocoques

Mise à jour
06/11/2026

Autres dénominations
Streptococcus Pneumoniae
Pneumonie À Pneumocoques
Méningite À Pneumocoques

Informations relatives à
Cabinets et polycliniques / Dentaire

Epidémiologie

Agent infectieux

Streptococcus pneumoniae

Réservoir

Homme

Mode de transmission

Par l'intermédiaire des gouttelettes ou par des objets contaminés par des sécrétions respiratoires fraîchement émises

La transmission de *S.pneumoniae* conduit le plus souvent à une colonisation mais pas à une infection. De ce fait, on ne propose pas d'isolement

Période d'incubation

1 à 3 jours

Durée d'infectiosité

Un traitement antibiotique par de la pénicilline permet de supprimer l'infectiosité en l'espace de 24 à 48 heures

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

L'application des Précautions Standard est suffisante

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Gants

Non indiqué en systématique

A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

Blouse de protection

- Non indiqué en systématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (Si risque de projection de liquides biologiques)

Masque de soins

- Non indiqué en systématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (risque de projection de liquides biologiques ou lors de symptômes respiratoires)

Lunettes de protection

- Non indiqué en sytématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (risque de projection de liquides biologiques)

Déclaration du cas

Déclaration au médecin cantonal

- Oui
- Utiliser le formulaire déclaration de résultats d'analyses cliniques : **Maladie à pneumocoques invasive**, site OFSP
  - A renvoyer au médecin cantonal dans un délai de 24h