

# Pneumonie à *Pneumocystis jiroveci*

Mise à jour  
14/11/2024Autres dénominations  
*Pneumocystis Jiroveci*

Informations relatives à  
Hôpitaux FHV, Cliniques, CTR / Soins intensifs

## Epidémiologie

## Agent infectieux

*Pneumocystis jiroveci* (anciennement *carinii*)

---

## Réservoir

Homme

---

## Mode de transmission

Probablement par voie aérienne

---

## Période d'incubation

Pas connue avec exactitude. Peut déjà se manifester 1 à 2 mois après le début d'une immunosuppression

---

## Durée d'infectiosité

Inconnue

---

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles

L'application des Précautions Standard en chambre individuelle est suffisante

---

## Placement

Chambre individuelle si possible

Une chambre à 2 lits est envisageable si le voisin de chambre est immunocompétent (le patient ne doit en aucun cas partager la chambre avec des patients immunocompromis tels que greffe d'organe ou de moelle, onco-hématologie, neutropénie sévère, immunosuppression médicamenteuse y compris stéroïdes, infection VIH avancée)

---

## Suivi microbiologique

Maladie révélatrice du diagnostic de sida: faire un test de dépistage VIH si absence d'autres facteurs prédisposants (immunosuppression, chimiothérapie, etc.)

---

## Durée des mesures

Levée des mesures de placement du patient en chambre individuelle à la fin du traitement de la pneumonie à *Pneumocystis*

---

## Transport

Port d'un masque de soins pour le patient pour éviter une transmission à un autre patient immunocompromis tels que

greffe d'organe ou de moelle, onco-hématologie, neutropénie sévère, immunosuppression médicamenteuse y compris stéroïdes, infection VIH avancée

-  Masque de soins pour le patient
  -  Literie et chemise du patient propres
  -  Désinfection du lit
  -  Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates
  -  Limiter les déplacements aux besoins essentiels
- 

## Circulation

Port d'un masque de soins pour le patient lors des déplacements dans l'hôpital pour éviter une transmission à un autre patient immunocompromis

---

## Visiteurs

-  Ne pas s'asseoir sur le lit
  -  Désinfection des mains en entrant et en sortant de la chambre
  -  Pas de visiteur immunocompromis
- 

## Autre

L'infection à *pneumocystis* peut être révélatrice du diagnostic de sida: faire un test de dépistage VIH si absence d'autres facteurs prédisposants (immunosuppression, chimiothérapie, etc.)

---

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

### hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydro-alcoolique (PHA)

---

## Gants

-  Non indiqués en systématique
  -  A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)
-

## Blouse de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Masque de soins

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Nettoyage et désinfection

### Matériel de soins

-  Dispositifs médicaux a usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque
  -  Vaisselle : filière habituelle
- 

### Lit et literie

-  Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre



Utiliser les sacs à linge usuels

---

## Environnement

Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien

---

## Déchets

Elimination des déchets selon les filières habituelles

---

## Déclaration du cas

### Déclaration au service HPCI

Oui

---

### Déclaration au médecin cantonal



Déclaration obligatoire que dans le cadre du SIDA: maladie indicatrice



Déclaration du médecin dans un délai d'une semaine

---