Pédiculose corporelle

Mise à jour
14/11/2024

Autres dénominations
Poux De Tête Ou De Corps

Informations relatives à
CHUV / Psychiatrie

Epidémiologie

Agent infectieux

- *Pediculus capitis* ou *Pediculus corporis*

Réservoir

- Homme
- Les poux du corps peuvent être vecteurs et transmettre 3 agents infectieux:
  - *Rickettsia prowazeki*
  - *Bartonella quintana*
  - *Borrelia recurrentis*

Mode de transmission

- Par contact direct entre patients
- Par l'intermédiaire du personnel (mains)
- Par contact indirect (matériel de soins ou d'examens, instruments, environnement immédiat, linge, literie)

Période d'incubation

- Libération des larves après 7 à 10 jours (température idéale 29°C-32°C)
- Durée du stade larvaire de 9 à 12 jours en fonction de la température

Durée d'infectiosité

Tant qu'il reste des oeufs vivants sur les cheveux, les poils ou les vêtements

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

- Mesures Additionnelles Contact

Placement

- Chambre individuelle
- Cohortage possible (regroupement de plusieurs patients avec le même germe)

Durée des mesures

- Jusqu'à 24 heures après le début d'un traitement efficace (absence de poux)

Suivi microbiologique

- Prévoir une consultation dermatologique en cas de résistance des poux au traitement

Soins de base

- En cas de douche commune, le patient en Mesures Additionnelles passe en dernier

Matériel de soins

- Réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles
- Privilégier le matériel à usage unique

Transport

- Vêtements propres
- Mettre une charlotte au patient
- Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates
- Limiter les déplacements pendant la durée de la maladie

Circulation

- Sorties limitées à la physiothérapie de mobilisation et aux besoins essentiels. Lors d’hospitalisation prolongée et si patient compliant, possibilité de sorties à l’extérieur
- Mettre une charlotte au patient
- Surblouse et gants pas nécessaires pour le patient
- Surblouse indiquée pour le soignant seulement si contact direct avec le patient

---

Visiteurs

- Ne pas s'asseoir sur le lit
- Désinfection des mains en sortant de la chambre
- Surblouse seulement si participation aux soins

Transfert/Sortie

- Avertir le service/l'établissement de soins de destination

Autre

- Les vêtements et effets personnels du patient doivent subir un traitement approprié contre les poux

Pédiculose du cuir chevelu

- Lavage à 60° des bonnets, foulards, taies d'oreiller, linge de lit, vêtements, peluches et doudous
- Mettre pendant 3 jours les effets personnels ne supportant pas une température de 60° dans un sac plastique fermé hermétiquement
- Désinfection des peignes et brosses à cheveux avec un shampoing pédiculicide
- Si matelas et couverture sans draps: désinfection du lit avec un pédiculicide en poudre ou spray

Pédiculose du corps et pubienne

- Lavage à 60° des vêtements, sous-vêtements, linge de lit
- Mettre pendant 3 jours les effets personnels ne supportant pas une température de 60° dans un sac plastique fermé hermétiquement
- Si matelas et couverture sans draps: désinfection du lit avec un pédiculicide en poudre ou spray

Mesures en cas d'épidémie

- Cohortage possible lors d'épidémie
- Se référer aux recommandations de l'unité HPCi-CHUV

Prise en charge des personnes contacts

Mesures

- Investigation des voisins de chambre et des personnes en contact étroit
- Si le patient est un enfant scolarisé ou une personne vivant en institution, le service médical scolaire ou de l'institution doit être averti

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

- Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique

Gants

- Non indiqués en systématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

Blouse de protection

- Oui, si contact direct avec le patient ou son environnement immédiat
- Pas nécessaire si simple passage dans la chambre

Masque de soins

- Non en systématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (risque de projection de liquides biologiques ou lors de symptômes respiratoires)

Lunettes de protection

- Non en systématique
- A porter selon les indications des Précautions Standard (risque de projections de liquides biologiques)

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel

A la levée des Mesures Additionnelles :

- Désinfecter tout le matériel à usage multiple présent en chambre
- Eliminer le matériel non désinfectable (boites de gants, masques, lingettes, etc) présent dans la zone patient (< 2 m)
- Conserver le matériel non désinfectable (boites de gants, masques, lingettes, etc) présent hors de la zone patient (> 2 m) sauf si souillures visibles

Lit et literie

- Utiliser les sacs à linge dédiés (double emballage), à envoyer à la buanderie interne (sac " linge patient" et sac "linge LBG") avec indication "pédiculose" sur

emballage. Les sacs "linge LBG" seront gardés 72 h avant d'être envoyés aux LBG.

A la levée des Mesures Additionnelles :

- Changer le lit et la literie

Environnement

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
- Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour
- Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement

A la levée des Mesures Additionnelles :

- Désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient (table de nuit, armoire patient, etc.)
- Nettoyage et désinfection de la chambre par le service propreté et hygiène
- Changement du rideau de lit ou nettoyage de la surface du paravent
- Trempage du rideau de la salle de bains

Déchets

- Elimination des déchets selon les filières habituelles

Déclaration du cas

Déclaration au service HPCI

Oui

Autre information

À consulter

Pédiculoses - Mesures dans les milieux de soins