

# Rage



Mise à jour  
15/11/2024

Informations relatives à  
EMS, EPSM, ESE, CAT



## Epidémiologie

## Agent infectieux




Virus de la rage (famille des Rhabdovirus)

---

## Réservoir

-  En Suisse : chauves-souris (la rage terrestre a été éradiquée)
  -  A l'étranger, variable selon les pays : canidés (chiens, renards), chauves-souris
- 

## Mode de transmission

-  Morsure, griffure, contact d'une blessure ou d'une muqueuse avec la salive d'un animal infecté
-  Transplantation d'organes (cornée) - exceptionnel
-  Inhalation d'aérosol contenant le virus (laboratoires)



Exceptionnel

---

## Période d'incubation

De quelques jours à plusieurs années, 3 à 8 semaines dans la majorité des cas

---

## Durée d'infectiosité

Transmission interhumaine exceptionnelle

---

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles

L'application des Précautions Standard est suffisante

---

## Autre



Prophylaxie post-expositionnelle de la rage



Voir Directives et recommandations de L'OFSP (onglet ressources)

---

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

# Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydro-alcoolique (PHA)

---

## Gants



Non indiqués en systématique



A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

---

## Blouse de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Masque de soins

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---



## lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques



---

# Nettoyage et désinfection

## Matériel de soins

-  Dispositifs médicaux a usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque
  -  Vaisselle : filière habituelle
- 

## Lit et literie

-  Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
  -  Utiliser les sacs à linge usuels
- 

## Environnement

Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien

---

## Déchets

Elimination des déchets selon les filières habituelles

---

## Déclaration du cas

# Déclaration au médecin cantonal

Déclaration du médecin dans les 24 heures

---