## Rage



Mise à jour 15/11/2024

Informations relatives à Hôpitaux FHV, Cliniques, CTR / Soins intensifs

## Epidémiologie

## Agent infectieux

Virus de la rage (famille des Rhabdovirus)

### Réservoir


- $\bigcirc$
- En Suisse : chauves-souris (la rage terrestre a été éradiquée)
- (5)

A l'étranger, variable selon les pays : canidés (chiens, renards), chauves-souris

### Mode de transmission

- (2)
- Morsure, griffure, contact d'une blessure ou d'une muqueuse avec la salive d'un animal infecté
- (>)
- Transplantation d'organes (cornée) exceptionnel
- ~

Inhalation d'aérosol contenant le virus (laboratoires)



### Période d'incubation

De quelques jours à plusieurs années, 3 à 8 semaines dans la majorité des cas

#### Durée d'infectiosité

Transmission interhumaine exceptionnelle

# Prise en charge du cas positif/suspect

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles

L'application des Précautions Standard est suffisante

### **Autre**



Prophylaxie post-expositionnelle de la rage



Voir Directives et recommandations de L'OFSP (onglet ressources)

# Mesures de protection/prévention pour le personnel

## Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydro-alcoolique (PHA)

### Gants

$\bigcirc$	Non indiqués en systématique
$\bigcirc$	A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

### Blouse de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

## Masque de soins

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

## lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

# Nettoyage et désinfection

## Matériel de soins

$\bigcirc$	Dispositifs médicaux a usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque						
$\bigcirc$	Vaisselle : filière habituelle						
Lit	t et literie						
(S)	Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre Utiliser les sacs à linge usuels						
Er	nvironnement						
Utili	Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien						
	échets						
Elin	nination des déchets selon les filières habituelles						

# Déclaration du cas

# Déclaration au médecin cantonal

ı	Déclaration	du	mádagin	dana	100 24	houron
ı	Declaration	all	menecin	nans	166 /4	neures