

Rage



Mise à jour
15/11/2024

Informations relatives à
CHUV / Endoscopie

Epidémiologie

Agent infectieux

Virus de la rage (famille des Rhabdovirus)

Réservoir



En Suisse : chauves-souris (la rage terrestre a été éradiquée)



A l'étranger, variable selon les pays : canidés (chiens, renards), chauves-souris

Mode de transmission



Morsure, griffure, contact d'une blessure ou d'une muqueuse avec la salive d'un animal infecté



Transplantation d'organes (cornée) - exceptionnel



Inhalation d'aérosol contenant le virus (laboratoires)



Exceptionnel

Période d'incubation

De quelques jours à plusieurs années, 3 à 8 semaines dans la majorité des cas

Durée d'infectiosité

Transmission interhumaine exceptionnelle

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles



Aucune, application des Précautions Standard

Autre



Prophylaxie post-expositionnelle de la rage: voir les directives et recommandations de L'OFSP

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains



Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique

Gants



Si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée

Blouse de protection



Si risque de projections de liquides biologiques

Masque de soins



Si risque de projections de liquides biologiques



Lors de symptômes respiratoires

lunettes de protection



Si risque de projections de liquides biologiques

Nettoyage et désinfection

Matériel de soins



Utiliser le détergent/désinfectant usuel



Retraiter le matériel à usage multiple après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque

Lit et literie



Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre



Utiliser les sacs à linge usuels



Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité

Environnement



Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien



Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour



Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement

Déchets



Elimination des déchets selon les filières habituelles

Déclaration du cas

Déclaration au médecin cantonal



Déclaration initiale du médecin dans les 24 heures
