

Rubéole



Mise à jour
15/11/2024

Informations relatives à
Hôpitaux FHV, Cliniques, CTR / Stérilisation

Epidémiologie

Agent infectieux

Virus de la rubéole (famille des Togavirus)

Réservoir

Homme

Mode de transmission

- Transmission par des gouttelettes, particules de grosse dimension (> 5 microns) dont la production est exacerbée par la toux, la conversation, certaines interventions: ex. bronchoscopie
- La dispersion de gouttelettes se limite à un rayon de 1 à 2 mètres depuis la source
- Les mains ou les gants contaminés par les gouttelettes peuvent aussi être un vecteur



Portes d'entrée: muqueuses (bouche, nez, gorge)

Période d'incubation

14 à 17 jours, avec des extrêmes allant de 14 à 21 jours

Durée d'infectiosité

Une semaine avant et jusqu'à 7 jours après le début de l'exanthème.

Les enfants qui ont contracté le virus in-utero peuvent excréter le virus pendant des mois après la naissance

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

Mesures Additionnelles GOUTTELETTES

Placement



Chambre individuelle.



Cohorte possible (placer plusieurs patients ayant le même agent infectieux dans la même chambre)

Durée des mesures

Jusqu'à 7 jours après le début de l'exanthème

Signalétique

- Affiche sur la porte à l'extérieur de la chambre (entrée) et intérieur (sortie)
 - Blouses/ masques de soins devant la chambre ou dans le SAS
 - Aux soins intensifs/continus, si pas de box disponible, délimiter le périmètre d'isolement géographique
 - Avant intervention chirurgicale: Communiquer au bloc opératoire les Mesures Additionnelles
-

Matériel de soins

- Le matériel de soins est réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles
 - Privilégier le matériel à usage unique (UU)
 - Prévoir un stock de matériel à UU pour 24h uniquement
-

Transport

- Faire porter un masque de soins au patient
- Literie et vêtements du résident propres
- Désinfection du lit

- Lors d'un transfert en cabinet médical ou à l'hôpital. pour mis en place des mesures adéquates, Avertir:

- le transporteur
 - le service de destination
-

Circulation

Limiter les déplacements aux besoins essentiels

Visiteurs

- Port d'un masque de soins
 - Ne pas s'asseoir sur le lit
 - Désinfection des mains en sortant de la chambre
 - Les femmes enceintes non immunes doivent éviter impérativement le contact avec les patients atteints de rubéole
-

Mesures en cas d'épidémie

- Cohorte possible lors d'épidémie
 - Se réréfer aux recommandations de l'unité HPCi
-

Autre

- Les personnes non immunes ne devraient pas entrer en contact avec les patients infectés
- Les femmes enceintes non immunes doivent éviter impérativement le contact avec les patients atteints de rubéole

Prise en charge des personnes contacts

Mesures

Enquête d'entourage selon les recommandations de l'unité HPCI

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydro-alcoolique (PHA)

Gants

- Non indiqués en systématique
 - A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)
-

Blouse de protection

- Oui, si contact direct avec le patient ou son environnement immédiat
 - Pas nécessaire si simple passage dans la chambre
-

Masque de soins

Masque de soins

lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Mesures complémentaires

- Vaccination du personnel non immun (vaccin ROR-V).
- Le personnel non immunisé ayant eu un contact non protégé avec un patient, doit contacter rapidement la médecine du personnel.
- Les femmes enceintes non immunisées doivent éviter impérativement le contact avec les patients atteints de rubéole

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins

➤ Dispositifs médicaux à usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque

➤ Vaisselle : filière habituelle

Lit et literie

➤ Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre

➤ Utiliser les sacs à linge usuels

➤ A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient, désinfecter le lit et changer la literie

Environnement

➤ Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien

➤ A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient:

➤ Désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient (table de nuit, statif, perfusomat, etc.)

➤ Idéalement, changement de rideau de séparation du patient

➤ Si paravent: nettoyage au quotidien

Déchets

Elimination des déchets selon les filières habituelles

Déclaration du cas

Déclaration à HPCi Vaud

Oui

Déclaration au service HPCI

Oui

Déclaration au médecin cantonal

Déclaration du médecin dans les 24 heures
