

# VIH

Mise à jour  
08/07/2024Autres dénominations  
Infection À VIH-HIVInformations relatives à  
Hôpitaux FHV, Cliniques, CTR / Endoscopie

## Epidémiologie

## Agent infectieux

Virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et VIH 2)

## Réservoir

Homme

## Mode de transmission



Lors de rapport sexuel non-protégé avec une personne infectée



Lors de blessures avec des instruments piquants/tranchants souillés par du sang d'une personne VIH-positive



Lors d'échanges de seringues entre toxicomanes



Les enfants de mère VIH-positive non-traitée peuvent s'infecter dans la période périnatale



Anciennement par administration parentérale de sang ou de produits sanguins contaminés

---

## Période d'incubation

Virémie détectable 7 à 30 jours après l'exposition

---

## Durée d'infectiosité

Une personne infectée reste potentiellement infectieuse à vie.

Le risque de transmission est très faible voire nul chez une personne sous trithérapie au long cours avec charge virale indétectable à plusieurs reprises

---

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles

L'application des Précautions Standard est suffisante (sauf si une autre infection opportuniste nécessite des mesures particulières)

---

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

### Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydro-alcoolique (PHA)

---

## Gants

Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques

---

## Blouse de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Masque de soins

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Mesures complémentaires

Toute exposition accidentelle à du sang ou des liquides biologiques doit être déclarée à la médecine du personnel afin d'évaluer l'indication à une éventuelle prophylaxie post-expositionnelle

---

## Nettoyage et désinfection

### Matériel de soins

-  Dispositifs médicaux a usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque
-  Vaisselle : filière habituelle

---

### Lit et literie

-  Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
-  Utiliser les sacs à linge usuels

---

### Environnement

Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien

---

### Déchets

Elimination des déchets selon les filières habituelles

---

## Déclaration du cas

## Déclaration au service HPCI

Oui

---

## Déclaration au médecin cantonal

Déclaration du médecin dans un délai de 1 semaine après confirmation du laboratoire

---