

Infections à staphylocoques dorés sensibles

Mise à jour
12/11/2024

Autres dénominations
MSSA

Informations relatives à
CMS et soignants indépendants

Epidémiologie

Agent infectieux

Staphylococcus aureus sensible à la méticilline

Réservoir

Homme, animal

Mode de transmission

Le plus souvent de personne à personne, parfois d'animal à personne, ainsi que manuportée ou par l'intermédiaire d'objets contaminés
Infection endogène (autoinfection) chez les personnes colonisées (environ 30% de la population générale est colonisée par des staphylocoques dorés au niveau du nez)

Période d'incubation

Variable, le plus souvent entre 4 et 10 jours

Durée d'infectiosité

Aussi longtemps que des lésions purulentes sont présentes ou qu'une personne reste colonisée

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

L'application des Précautions Standard est suffisante

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydro-alcoolique (PHA)

Gants

Non indiqués en systématique

A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

Blouse de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Masque de soins

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Nettoyage / désinfection

Matériel de soins



Dispositifs médicaux à usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque



Vaisselle : filière habituelle

Lit et literie



Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre



Utiliser les sacs à linge usuels

Environnement

Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien

Déchets

Elimination des déchets selon les filières habituelles
