

# Infections à staphylocoques dorés sensibles



Mise à jour  
12/11/2024

Autres dénominations  
MSSA

Informations relatives à  
Hôpitaux FHV, Cliniques, CTR / Psychiatrie

## Epidémiologie

## Agent infectieux

*Staphylococcus aureus* sensible à la méticilline

---

## Réservoir

Homme, animal

---

## Mode de transmission

Le plus souvent de personne à personne, parfois d'animal à personne, ainsi que manuportée ou par l'intermédiaire d'objets contaminés  
Infection endogène (autoinfection) chez les personnes colonisées (environ 30% de la population générale est colonisée par des staphylocoques dorés au niveau du nez)

---

## Période d'incubation

Variable, le plus souvent entre 4 et 10 jours

---

## Durée d'infectiosité

Aussi longtemps que des lésions purulentes sont présentes ou qu'une personne reste colonisée

---

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles

-  Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante
  -  Instaurer des Mesures Additionnelles CONTACT si plaie et/ou écoulement difficile à contenir par un pansement
- 

## Placement

### Si Mesures Additionnelles Contact :

-  Chambre individuelle
  -  Cohortage possible (regroupement de plusieurs patients avec le même germe)
- 

## Durée des mesures



Jusqu'à l'arrêt de l'écoulement non contenu par un pansement

---

## Suivi microbiologique



Pas nécessaire de faire un prélèvement de suivi sauf avis contraire HPCi

---

## Soins de base



En cas de douche commune, le patient en Mesures Additionnelles passe en dernier

---

## Matériel de soins



Le matériel de soins est réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles



Privilégier le matériel à usage unique

---

## Transport

### **Si Mesures Additionnelles Contact :**



Vêtements propres



Pansements hermétiques et non souillés



Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates



Limiter les déplacements pendant la durée de la maladie

---

## Circulation

### Si Mesures Additionnelles Contact :



Sorties limitées à la physiothérapie de mobilisation et aux besoins essentiels.  
Lors d'hospitalisation prolongée et si patient compliant, possibilité de sorties à l'extérieur



Pansement hermétique et non souillé



Surblouse et gants pas nécessaires pour le patient



Surblouse indiquée pour le soignant seulement si contact direct avec le patient

---

## Visiteur

### Si Mesures Additionnelles Contact :



Ne pas s'asseoir sur le lit



Désinfection des mains en sortant de la chambre



Surblouse seulement si participation aux soins

---

## Transfert/Sortie

### Si Mesures Additionnelles Contact :



Avertir le service/établissement de soins de destination

---

## Mesures en cas d'épidémie

-  Cohortage possible lors d'épidémie
-  Se référer aux recommandations de l'unité HPCI-CHUV

---

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

### Hygiène des mains

-  Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique

---

### Gants

-  Non indiqués en systématique
-  A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

---

### Blouse de protection

-  Si risque de projections de liquides biologiques
  -  Ou si Mesures Additionnelles Contact (sauf si simple passage dans la chambre)
-

## Lunettes de protection

-  Non en systématique
-  A porter selon les indications des Précautions Standard (risque de projections de liquides biologiques)

---

## Nettoyage / désinfection

### Matériel de soins

-  Utiliser le détergent/désinfectant usuel
- A la levée des Mesures Additionnelles :**
-  Désinfecter tout le matériel à usage multiple présent en chambre
-  Eliminer le matériel non désinfectable (boites de gants, masques, lingettes, etc) présent dans la zone patient (< 2 m)
-  Conserver le matériel non désinfectable (boites de gants, masques, lingettes, etc) présent hors de la zone patient (> 2 m) sauf si souillures visibles

---

### Lit et literie

-  Utiliser les sacs à linge usuels
-  Se désinfecter les mains avant toute manipulation de linge propre
-  Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité

**A la levée des Mesures Additionnelles :**

-  Changer le lit et la literie
-

# Environnement

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
- Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour
- Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement

## **A la levée des Mesures Additionnelles :**

- Désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient (table de nuit, armoire patient, etc.)
  - Nettoyage et désinfection de la chambre par le service propreté et hygiène
  - Changement du rideau de lit ou nettoyage de la surface du paravent
  - Trempage du rideau de la salle de bains
- 

# Déchets

- Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique
-