

Syphilis

Mise à jour
18/11/2024Autres dénominations
Treponema PallidumInformations relatives à
EMS, EPSM, ESE, CAT

Epidémiologie

Agent infectieux

Treponema pallidum

Réservoir

Homme

Mode de transmission



Par contact direct avec des lésions cutanées ou muqueuses au stade I et II lors de rapports sexuels oraux, anaux ou vaginaux



Par transmission transplacentaire



Par contact indirect avec du matériel contaminé (possible mais exceptionnel)



Par transfusion sanguine si donneur infecté et dans un stade précoce de la maladie

Période d'incubation

10 jours à 3 mois, en moyenne 3 semaines

Durée d'infectiosité



Aussi longtemps que des lésions cutanées et muqueuses sont présentes.



Disparition du risque de transmission 24 à 48 heures après le début d'un traitement de pénicilline

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

L'application des Précautions Standard est suffisante

Prise en charge des personnes contacts

Mesures

Dépistage et traitement du(des) partenaire(s) sexuel(s)

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydro-alcoolique (PHA)

Gants



Non indiqués en systématique



A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

Blouse de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Masque de soins

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Nettoyage et désinfection

Matériel de soins

-  Dispositifs médicaux a usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque
-  Vaisselle : filière habituelle

Lit et literie

-  Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
-  Utiliser les sacs à linge usuels

Environnement

Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien

Déchets

Elimination des déchets selon les filières habituelles

Déclaration du cas

Déclaration au médecin cantonal



Déclaration du médecin dans un délai de 1 semaine.



Les flambées de cas doivent être déclarées au médecin cantonal dans un délai de 1 jour

