

# Syphilis



Mise à jour  
18/11/2024

Autres dénominations  
Treponema Pallidum

Informations relatives à  
Cabinets et polycliniques / Dentaire

## Epidémiologie

### Agent infectieux

*Treponema pallidum*

---

### Réservoir

Homme

---

### Mode de transmission

- Par contact direct avec des lésions cutanées ou muqueuses au stade I et II lors de rapports sexuels oraux, anaux ou vaginaux
- Par transmission transplacentaire
- Par contact indirect avec du matériel contaminé (possible mais exceptionnel)

- Par transfusion sanguine si donneur infecté et dans un stade précoce de la maladie
- 

## Période d'incubation

10 jours à 3 mois, en moyenne 3 semaines

---

## Durée d'infectiosité

- Aussi longtemps que des lésions cutanées et muqueuses sont présentes.
- Disparition du risque de transmission 24 à 48 heures après le début d'un traitement de pénicilline

---

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles

L'application des Précautions Standard est suffisante

---

## Prise en charge des personnes contacts

### Mesures

Dépistage et traitement du(des) partenaire(s) sexuel(s)

---

# Mesures de protection/prévention pour le personnel

## Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydro-alcoolique (PHA)

---

## Gants

- Non indiqués en systématique
  - A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)
- 

## Blouse de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Masque de soins

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Nettoyage et désinfection

### Matériel de soins

- Dispositifs médicaux à usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque
  - Vaisselle : filière habituelle
- 

### Lit et literie

- Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
  - Utiliser les sacs à linge usuels
- 

### Environnement

Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien

---

### Déchets

Elimination des déchets selon les filières habituelles

---

### Déclaration du cas

## Déclaration au médecin cantonal

- Déclaration du médecin dans un délai de 1 semaine.
  - Les flambées de cas doivent être déclarées au médecin cantonal dans un délai de 1 jour
-