



BOP : Personnel - Désinfection hygiénique des mains : indications

Produits : Produit hydro-alcoolique ou gel alcoolique

Objectif : Prévenir les infections associées aux soins

Moments où la désinfection des mains est recommandée (liste non exhaustive)

| | MOMENTS | SITUATIONS |
|---|---|--|
| 1 | Avant contact direct avec le patient | Avant de toucher le patient et ses vêtements. Avant la prise des paramètres vitaux Avant un soin, traitement ou examen clinique non invasifs Doit être fait au plus près du patient |
| 2 | Avant un acte propre et aseptique | Avant de mettre des gants stériles ou non stériles Avant de préparer du matériel stérile Avant de préparer des injectables Avant de placer une voie veineuse Avant tout acte invasif Avant toute manipulation sur une voie intravasculaire Avant la préparation cutanée du patient |
| 3 | Après un risque d'exposition à un liquide biologique | Après le retrait des gants Après avoir pratiqué une injection ou ponction percutanée, après ouverture d'un circuit connecté à un DMx Après insertion ou/et retrait d'un DMx Après manipulation d'un échantillon de matière organique |
| 4 | Après un contact direct avec le patient | Après la prise des paramètres vitaux Après avoir installé le patient Après avoir dispensé des soins ou tout autre traitement non invasif |
| 5 | Après un contact avec un objet ou l'environnement du patient | Après le réglage de perfusions, gestion d'alarme sans contact direct avec le patient Après tout contact avec surfaces ou objets de son environnement Après les tâches d'entretien |