

Hémodialyse chronique : Tableau récapitulatif des mesures à instaurer pour des patients porteurs de virus transmis par le sang ou de germes multiresistants

Agents	Transmission	Précautions Standard et Bonnes pratiques d'injection	Mesures particulières
<p>Hépatite B (HBV) Haute concentration de virus circulant si HBs Ag pos.</p>	percutanée et par muqueuse	OUI	<p>Précautions additionnelles Zone séparée Pool de machines réservées aux patients HBV HbsAg pos Personnel vacciné contre HBV et avec séroconversion documentée</p>
<p>Hépatite B (HBV) avec infection concomitante Hépatite D (HDV) Très haute concentration de virus circulant Infection possible chez les patients avec infection HBV active</p>	percutanée et par muqueuse	OUI	<p>Précautions additionnelles Zone séparée Machine dédiée au patient Personnel vacciné contre HBV et avec séroconversion documentée et ne dialyse pas d'autres patients HBV</p>
<p>Hépatite C (HCV) Faible concentration de virus circulant</p>	percutanée	OUI	NON
<p>VIH Transmission percutanée et par muqueuse</p>	percutanée et par muqueuse	OUI	NON
<p>MRSA Patient colonisé</p>	par contact	OUI	<p>Mesures Additionnelles contact Zone commune + blouse de protection pour tout contact direct</p>
<p>MRSA Patient infecté</p>	par contact	OUI	<p>Mesures Additionnelles contact Zone séparée + blouse de protection pour tout contact direct Masque si : plaie infectée ou pneumonie</p>
<p>VRE - (vancomycin resistant Enterococcus) Patient infecté ou colonisé</p>	par contact	OUI	<p>Mesures Additionnelles contact Zone séparée + blouse de protection pour tout contact direct</p>
<p>Autre BMR Patient infecté ou colonisé</p>	Par contact	OUI	<p>Mesures Additionnelles contact Zone séparée + blouse de protection pour tout contact direct</p>