

**DP - bilan sérologique: interprétation**

Marqueurs sérologiques			Interprétation	Contrôles sérologiques
<b>HÉPATITE A</b>	<b>AC anti-HAV</b>			
	Pos		infection ancienne ou vaccination	Pas de suivi
<b>HEPATITE C</b>	<b>AC anti-HCV</b>	<b>PCR HCV</b>		
	Neg	--	Pas d'infection	AC anti-HCV 1x/an
	Pos	Neg	ancienne hépatite C, non contagieux	PCR HCV 1x/an
	Pos	Pos	infection aigue au décours ou chronique, <b>contagieux</b>	Selon avis consult spécialisée
<b>VIH</b>	<b>HIV1 Ag p24</b>	<b>AC anti HIV1/HIV2</b>		
	Neg	Neg	Pas d'infection	HIV1 Ag p24 et AC anti-HIV1/HIV2 1x/an
	Pos	Neg	primo-infection, début d'incubation	Selon avis consult spécialisée
	Pos	Pos	primo-infection au décours, infection mal contrôlée (SIDA)	Selon avis consult spécialisée
	Neg	Pos	infection chronique	Selon avis consult spécialisée
<b>HEPATITE B</b>				
<b>HBs Ag</b>	<b>AC anti-HBc</b>	<b>AC anti-HBs</b>		
Neg	Neg	Neg	Pas d'infection, <b>à vacciner</b>	Contrôle 4-6 sem post vaccin
Pos	Neg	Neg	Infection aigue, début d'incubation, <b>contagieux</b>	Contrôle à 6 mois puis 1x/an
Pos	Pos	Neg	infection aigue ou chronique active, <b>contagieux</b>	Contrôle à 6 mois puis 1x/an
Neg	Pos	Neg	infection aigue au décours, infection chronique à bas bruit ou faux-positif, peut être contagieux	Demander PCR HBV et contrôle des marqueurs à 2 mois puis selon résultats
Neg	Pos	Pos	infection ancienne guérie, <b>non contagieux</b>	Pas de contrôle
Neg	Neg	≥10IU/L	couverture vaccinale adéquate, <b>non contagieux</b>	Contrôle AC Anti-HBs 1x/an
Neg	Neg	<10IU/L	couverture non adéquate, <b>à vacciner, non contagieux</b>	Contrôle Ag HBs et AC Anti-HBs 1x/an

Ce document a été élaboré par l'Unité HPCI en collaboration avec les cellules régionales HPCI et les différents centres de dialyse du canton de Vaud, sous l'expertise du SMPH, CHUV.