

BOP: Personnel - Protection faciale et oculaire: indications et types

La protection faciale (masque à visière inclus) est :

- obligatoire en salle d'opération
- mise et ajustée avant de pénétrer en salle d'opération
- toujours attachée avec les deux attaches
- ne doit plus être touchée une fois ajustée
- ne doit jamais être portée en bavette ni autour du cou
- doit être changée si elle est humide ou souillée (chirurgiens, instrumentistes)
- changée avant toute nouvelle intervention
- éliminée immédiatement après emploi et avant de sortir de salle d'opération

La protection oculaire est :

- à porter obligatoirement lors d'actes avec risque de projections de liquide biologique (concerne également les porteurs de lunettes médicales car absence de protection latérale)
- peut être conservée le temps de l'intervention.
- à nettoyer / désinfecter après utilisation si à usage multiple :
- à éliminer après intervention /soin (filière déchets urbains) si à usage unique :

Remarque :

- Lors d'éternuement ou de toux, garder la tête droite devant le champ opératoire afin de ne pas compromettre l'efficacité de la protection barrière du masque chirurgical
- Le masque ultrafiltrant FFP (2 ou3) est à changer dès qu'il est mouillé à l'intérieur ou souillé à l'extérieur.

TYPES DE MASQUE



Masque traditionnel ou antibuée (porteurs de lunettes) imperméable aux liquides



Masque à visière **antibuée** et imperméable aux liquides



Masque ultra filtrant à porter lors
- Interventions chirurgicales en présence de germes transmis par aérosol, ex. tuberculose
- Intubation chez cette même catégorie de patients

TYPES DE PROTECTION OCULAIRE



Masque à visière imperméable aux

antibuée et liquides



Lunettes de protection + masque chirurgical



MODE D'EMPLOI



1. fixer les liens supérieurs en les passant au-dessus des oreilles



2. les liens inférieurs au niveau de la nuque



3. ne pas les croiser.



4. ouvrir et ajuster les soufflets de manière à recouvrir le nez et le menton



5. ajuster la barrette rigide de façon à épouser les contours du nez et des pommettes



6. se désinfecter les mains après avoir mis le masque