

**Plan de vaccination des professionnels** (liste des vaccins est non exhaustive)

Vaccination	Indication	Vaccins	Fréquence	Commentaires
<b>Grippe saisonnière</b>	Tout soignant	Agrippal®, Fluarix Tetra®, Fluad®, Influvac® ; Mutagrip®,	1x/ année	Une couverture de 80% des résidents et du personnel permet d'obtenir une immunité de population (type "Herd Immunity"). Vaccin recommandé dès la mi-novembre
<b>Hépatite B</b>	Tout soignant Personnel avec risque de contact avec les liquides biologiques	Engerix®, Gen H-B-Vax®,* HBVAXPRO®, Heprecomb®,* Hexavac®,* Infanrix®, Twinrix®,	J0 – J30 – J180	Contrôle du status sérologique après dernière dose. Les non répondeurs (Anti HBs< 10UI/l et hypo répondeurs (entre 10 et 100 UI/l) seront informés
<b>Diphtérie / Tétanos</b>	Tout le personnel Se référer au plan de vaccination de routine de l'Office fédéral de la santé publique	Boostrix®, Revaxis®, Td-pur®,	J0 – J60 – entre J180 et J360	<b>Vaccin combiné diphtérie tétanos</b> Peut être utilisé pour l'immunisation active et pour les rappels. Rappel : Personnes entre 25 et 65 ans, 1 dose tous les 20 ans. Personne > 65 ans ou immunosupprimé 1 dose tous les 10 ans
<b>Varicelle, Rubéole, Rougeole, Oreillons</b>	Tout le personnel Se référer au plan de vaccination de routine de l'Office fédéral de la santé publique	<b>Rougeole :</b> Moraten®/Rimevax®/Rouvax® <b>Varicelle :</b> Varilrix®, Varivax® <b>ROR :</b> Priorix®/ Trimovax® <b>RORV :</b> Priorix tetra®		Le statu doit être contrôlé et complété le cas échéant.

**Posologies :** Les posologies dépendent du fabricant du vaccin. Suivre scrupuleusement les indications du fabricant pour la reconstitution éventuelle, l'administration du vaccin et pour le stockage.