

## GESTION DU LINGE SALE

### DOMAINE D'APPLICATION

Département de psychiatrie

## MANIPULATION DU LINGE DANS LES UNITÉS

### Linge propre

- Se désinfecter les mains avant toute manipulation de linge propre
- Stocker le linge dans un lieu fermé sec, à l'abri du flux des personnes et de la poussière
- Limiter dans l'unité, le stock de linge à une quantité nécessaire prédéterminée

### Linge sale

- Manipuler le linge souillé avec des liquides ou matières biologiques **avec des gants**. (Rappel : le port de gants n'est pas nécessaire si le linge sale n'est pas souillé)
- **Dégrossir à sec le linge souillé dans l'unité** (à l'aide d'un papier absorbant par ex)
- **Collecter** (après l'avoir dégrossi à sec) **séparément le linge « patient » fortement souillé par des liquides biologiques** dans un sac transparent, le fermer et le déposer dans le sac à linge « effet patient »
- **Ne jamais rincer** du linge dans les unités
- Se **désinfecter les mains** après toute manipulation de linge sale et après retrait des gants
- Éviter que du linge sale entre en contact avec les vêtements, le linge propre, les patients et l'environnement
- Ne pas poser le linge au sol
- Déposer le plus rapidement possible le linge sale dans le sac servant à son transport
- Ne pas transvaser de linge d'un sac à un autre
- Ne pas remplir les sacs à linge sale au delà des 2/3 de leur capacité
- En cas de souillures, nettoyer avec un détergent/désinfectant l'extérieur des sacs de linge sale
- Ne pas laisser traîner des sacs à linge ouverts
- Bien fermer les sacs avant leur transport
- Les sacs à linge sont stockés dans le local sale
- Ne jamais traîner les sacs de linge sale sur le sol mais effectuer leur transport interne dans des chariots/containers strictement réservés à cet usage

### Mode d'évacuation

Il n'est pas nécessaire de prévoir une filière spécifique pour le linge lors de Mesures Additionnelles, sauf sur avis de l'HPCI. Chez les patients en Mesures Additionnelles notifier sur l'étiquette "Mesures HPCI" lors de la prise en charge des effets personnels.

### Linge plat (drap, linge de bains, taie duvet, taie oreiller, etc)

- évacuation dans sac blanc LBG

### Duvet/oreiller/rideau

- évacuation dans sac transparent pour SPO et SPC
- pour SPN:
  - linge de l'institution: évacuation dans sac transparent
  - linge privé: évacuation dans sac transparent LBG linge privé

### **Literie** difficilement déchirable et difficilement inflammable

- évaluation dans sac transparent LBG

### **Linge patient**

- sac effet patient avec inventaire
- sac à déposer dans le sac transparent du local sale

## MANIPULATION DU LINGE DANS LES BUANDERIES INTERNES

### **Linge propre**

- Ne pas passer d'une zone sale à une zone propre avec du matériel de protection
- Planifier des circuits propres et sales afin d'éviter tout croisement du linge
- **Se laver les mains ou se désinfecter les mains avant de manipuler du linge propre**

### **Linge sale**

- L'entreposage et le tri éventuel du linge sale doivent être effectués dans la zone sale
- Trier le linge avec des gants, une surblouse ou tablier et un masque
- **Le linge qui est contenu dans un double emballage (petit sac transparent) ne doit pas être manipulé (pas de tri). Son contenu sera directement mis en machine**
- **Le linge souillé ne doit pas être rincé ni trempé avant d'être mis en machine**
- Les gants, la surblouse ou le tablier et le masque seront éliminés dès la fin du tri
- Se laver ou se désinfecter les mains après toute manipulation de linge sale, après retrait des gants et avant de toucher au linge propre
- Le lavage à sec doit être strictement réservé aux vêtements ne supportant pas un autre traitement
- Le séchage et le repassage assurent également un effet microbicide sur la plupart des germes. Il n'est donc pas nécessaire de traiter à part le linge provenant d'un patient en Mesures Additionnelles, sauf avis contraire de l'HPCI
- Nettoyer avec un produit détergent les moyens de transport (chariot, containers, etc.) après la livraison

### **Mode de traitement**

#### **Linge plat, duvet, oreiller, rideau, literie difficilement déchirable et difficilement inflammable**

- lavage en machine à une température de 60° ou plus
- ajouter un désinfectant (oxygène actif) au produit de lessive si le linge est lavé à une température < 60°C

#### **Linge patient**

- lavage en machine à une température de 60°C ou plus
- en cas de linge souillé devant être lavé à une température < 60°C, il est recommandé d'ajouter un désinfectant (oxygène actif) au produit de lessive

#### Remarque

Une température de 40°C permet d'éliminer la grande majorité des microorganismes.

**PIÈCE(S) JOINTE(S):**

 [DP traitement du linge \(https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/prevention/DP-Traitement%20du%20linge%20HPCI\\_W\\_FT\\_00017.pdf\)](https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/prevention/DP-Traitement%20du%20linge%20HPCI_W_FT_00017.pdf)

---

Dernière mise à jour le 19/09/2017