

DIAL - BILAN SÉROLOGIQUE DU PATIENT EN HÉMODIALYSE

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Hépatite A

Marqueurs sérologiques	Interprétation	Contrôles sérologiques
AC anti-HAV pos	Infection ancienne	Pas de suivi

Hépatite C

Marqueurs sérologiques	Marqueurs sérologiques	Interprétation	Contrôles sérologiques
AC anti-HCV neg	--	Pas d'infection	AC anti-HCV 2x/an
AC anti-HCV pos	PCR HCV neg	Ancienne hépatite C, non contagieux	PCR HCV 2x/an
AC anti-HCV pos	PCR HCV pos	Infection aigue au décours, contagieux	Selon avis consult spécialisée

VIH

Marqueurs sérologiques	Marqueurs sérologiques	Interprétation	Contrôles sérologiques
HIV1 Ag p24 neg	AC anti HIV1/HIV2 neg	Pas d'infection	HIV1 Ag p24 et AC anti-HIV1/HIV2 1-2x/an selon le risque
HIV1 Ag p24 pos	AC anti HIV1/HIV2 neg	Primo-infection, début d'incubation	Selon avis consult spécialisée
HIV1 Ag p24 pos	AC anti HIV1/HIV2 pos	Primo-infection au décours, infection mal contrôlée (SIDA)	Selon avis consult spécialisée
HIV1 Ag p24 neg	AC anti HIV1/HIV2 pos	Infection chronique	Selon avis consult spécialisée

Hépatite B

Marqueurs sérologiques	Marqueurs sérologiques	Marqueurs sérologiques	Interprétation	Contrôles sérologiques
HBs Ag neg	AC anti-HBc neg	AC anti-HBs neg	Pas d'infection, à vacciner	Contrôle 4-6 sem post vaccin
HBs Ag pos	AC anti-HBc neg	AC anti-HBs neg	Infection aigue, début d'incubation, contagieux	Contrôle à 6 mois puis 2x/an
HBs Ag pos	AC anti-HBc pos	AC anti-HBs neg	Infection aigue, contagieux	Contrôle à 6 mois puis 2x/an
HBs Ag neg	AC anti-HBc pos	AC anti-HBs neg	Infection aigue au décours, infection chronique à bas bruit ou faux-positif	Demander PCR HBV et contrôle des marqueurs à 2 mois puis selon résultats
HBs Ag neg	AC anti-HBc pos	AC anti-HBs pos	Infection ancienne guérie, non contagieux	Pas de contrôle

Post vaccination hépatite B

Marqueurs sérologiques	Marqueurs sérologiques	Marqueurs sérologiques	Interprétation	Contrôles sérologiques
HBs Ag neg	AC anti-HBc neg	AC anti HBs > ou = 10IU/L	Couverture vaccinale adéquate, non contagieux	Contrôle AC Anti-HBs 2x/an
HBs Ag neg	AC anti-HBc neg	AC anti-HBs <10IU/L	Couverture non adéquate, à vacciner, non contagieux	Contrôle Ag HBs et AC Anti-HBs 2x/an

PIÈCE(S) JOINTE(S):

 [HPCI W_FT_00204.pdf \(https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/prevention/HPCI_W_FT_00204.pdf\)](https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/prevention/HPCI_W_FT_00204.pdf)

 [algorithm bilan serol HPCI W_FT_00322.pdf
\(https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/prevention/algorithm%20bilan%20serol_HPCI_W_FT_00322_0.pdf\)](https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/prevention/algorithm%20bilan%20serol_HPCI_W_FT_00322_0.pdf)

Microorganismes et pathologies:

Hépatite A

Hépatite B

Hépatite A

Hépatite B

Dernière mise à jour le 07/11/2016