

## BOP - PROTECTION FACIALE ET OCULAIRE: INDICATIONS ET TYPES

### La protection faciales (masque à visière inclus) est:

- obligatoire en salle d'opération
- mise et ajustée avant de pénétrer en salle d'opération
- toujours attachée avec les deux attaches
- ne doit plus être touchée une fois ajustée
- ne doit jamais être portée en bavette ni autour du cou
- doit être changée si elle est humide ou souillée (chirurgiens, instrumentistes)
- changée avant toute nouvelle intervention
- éliminée immédiatement après emploi et avant de sortir de salle d'opération

### La protection oculaire est :

- à porter obligatoirement lors d'actes avec risque de projections de liquide biologique (concerne également les porteurs de lunettes médicales car absence de protection latérale)
- peut être conservée le temps de l'intervention.
- à nettoyer / désinfecter après utilisation si à usage multiple :
- à éliminer après intervention /soin (filrière déchets urbains) si à usage unique :

### Remarque :

- Lors d'éternuement ou de toux, garder la tête droite devant le champ opératoire afin de ne pas compromettre l'efficacité de la protection barrière du masque chirurgical
- Le masque ultrafiltrant FFP (2 ou 3) est à changer dès qu'il est mouillé à l'intérieur ou souillé à l'extérieur.

## TYPES DE MASQUE



Masque traditionnel ou  
antibuée (porteurs de lunettes)  
imperméable aux liquides



Masque à visière antibuée et  
imperméable aux liquides



Masque ultra filtrant à porter lors  
- Interventions chirurgicales en  
présence de germes transmis  
par aérosol, ex. tuberculose  
- Intubation chez cette même  
catégorie de patients

## TYPES DE PROTECTION OCULAIRE



Masque à visière  
imperméable aux

antibuée et  
liquides



Lunettes de protection + masque chirurgical



## MODE D'EMPLOI



1. fixer les liens  
supérieurs en  
les passant au-  
dessus des  
oreilles



2. les liens  
inférieurs au  
niveau de la  
nuque



3. ne pas les  
croiser.



4. ouvrir et  
ajuster les  
soufflets de  
manière à  
recouvrir le nez  
et le menton



5. ajuster la  
barrette rigide de  
façon à  
épouser les  
contours du nez  
et des  
pommettes



6. se désinfecter  
les mains après  
avoir mis le  
masque

### PIÈCE(S) JOINTE(S):

 [HPCI\\_W\\_FT\\_00284.pdf \(https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/prevention/HPCI\\_W\\_FT\\_00284.pdf\)](https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/prevention/HPCI_W_FT_00284.pdf)

Dernière mise à jour le 03/05/2017