

## VACCINATION DES PATIENTS ET DU PERSONNEL SOIGNANT

### DOMAINE D'APPLICATION

#### Département de psychiatrie, EMS, ambulatoire

Les vaccinations sont des mesures préventives qui permettent d'éviter l'apparition de différentes maladies infectieuses pouvant présenter des complications graves. Elles imitent l'immunisation naturelle. Les vaccinations de bases sont recommandées parce qu'elles sont essentielles à la santé individuelle et collective; elles confèrent un niveau de protection indispensable au bien-être de la population

### COUVERTURE VACCINALE DES RÉSIDENTS

#### Grippe saisonnière

Indication	Vaccin	Posologie	Fréquence	Commentaires
Tous les résidents	Fluarix <sup>®</sup> Fluarix Tetra <sup>®</sup> Mutagrip <sup>®</sup> Influvac <sup>®</sup> Influvac <sup>®</sup> plus, Inflexal V <sup>®</sup> Vaxigrip Tetra <sup>®</sup>	0.5 ml IM (deltoïde)	Vaccin annuel	Une couverture de 80 % des résidents d'obtenir une immunité de population Vaccin recommandé dès novembre

#### Pneumocoque

Indication	Vaccin	Posologie	Fréquence	Commentaires
Résidents avec risque d'infections ou de complications d'infections pneumococciques (maladies pulmonaires chroniques, insuffisance cardiaque sévère, diabète, insuffisance rénale, abus d'alcool)	Prenevar <sup>®</sup> 13	0.5 ml IM (deltoïde) ou s/cut	1 dose	Lorsque le status vaccinal n'est pas à jour, recommandé de vacciner le résident d'inscrire la date de la vaccination

## Diphthérie / tétanos

Indication	Vaccin	Posologie	Fréquence	Commentaires
Tous les résidents  En présence de plaie ouverte exposée avec vaccination ou rappel anti-tétanique de > de 10 ans	Ditanrix <sup>®</sup>  AnatoxalDiTe <sup>®</sup> N	0.5 ml IM (deltoïde)	<b>3 doses :</b> 1 dose J0, 1 dose J60 et 1 dose entre J180 - J360  1 dose de rappel	<b>Vaccin combiné dphthérie - té</b> Peut être utilisé pour l'immunisation

## Tétanos seul

Indication	Vaccin	Posologie	Fréquence	Commentaires
En présence de plaie ouverte exposée avec vaccination ou rappel anti-tétanique de > de 10 ans	AnatoxalTe <sup>®</sup> N	0.5 ml IM (deltoïde)	1 dose	

## Hépatite A

Indication	Vaccin	Posologie	Fréquence	Commentaires
Résident avec infection à HIV, HBV ou HCV	Havrix <sup>®</sup> 1440	1 ml IM (deltoïde)	<b>2 doses :</b> 1 dose J0 et 1 dose entre J180 - J360	Une infection à HAV sera exclue chez un porteur de HCV, HVB ou HIV

## COUVERTURE VACCINALE DU PERSONNEL SOIGNANT

### Grippe saisonnière

Indication	Vaccin	Fréquence	Commentaires
Tout le personnel soignant	Agrippal Fluarix Tetra <sup>®</sup> Vaxigrip Tetra <sup>®</sup> Influvac <sup>®</sup> Mutagrip <sup>®</sup>	Vaccin annuel	Une couverture de 80 % des résidents d'obtenir une immunité de population (1 Vaccin recommandé dès la mi novemb

## Hépatite B

Indication	Vaccin	Fréquence	Commentaires
Tout le personnel soignant avec risque de contact avec des liquides biologiques	Engerix-B <sup>®</sup> Gen H-B-Vax <sup>®</sup> HBVAXPRO <sup>®</sup> Heprecomb <sup>®</sup> Hexavac <sup>®</sup> Infanrix <sup>®</sup> Twinrix <sup>®</sup>	<b>3 doses :</b> 1 dose J0 et 1 dose entre J30 1 dose à J180	Contrôle du statut séro Les non répondeurs (A répondeurs (entre 10 €

## Diphtérie / tétanos

Indication	Vaccin	Fréquence	Commentaires
Tout le personnel soignant Se référer au plan de vaccination de routine de l'Office fédéral de la santé publique	Boostrix <sup>®</sup> Revaxis <sup>®</sup> Td-pur <sup>®</sup>	<b>3 doses :</b> 1 dose J0, 1 dose J60 et 1 dose entre J180 - J360 puis dose de rappel tous les 10 ans	<b>Vaccin combiné dphtérie - tétanos</b> Peut être utilisé pour l'immunisation active et les rappels  <b>Rappel :</b> Personnes entre 25 et 65 ans : 1 dose tous les 20 ans Personnes de plus de 65 ans ou immunosupprimées :

### Varicelle / rubéole / Rougeole / Oreillons

Indication	Vaccin	Fréquence	Commentaires
Tout le personnel soignant Se référer au plan de vaccination de routine de l'Office fédéral de la santé publique	<b>Rougeole :</b> Moraten <sup>®</sup> /Rimevax <sup>®</sup> / Rouvax <sup>®</sup> <b>Varicelle :</b> Varilrix <sup>®</sup> , Varivax <sup>®</sup> <b>ROR :</b> Priorix <sup>®</sup> / Trimovax <sup>®</sup> <b>RORV :</b> Priorix tetra <sup>®</sup>		Le statut doit être contrôlé et complété le cas échéant.

**Posologies :** Les posologies dépendent du fabricant du vaccin. Suivre scrupuleusement les indications du fabricant pour la reconstitution éventuelle, l'administration du vaccin et pour le stockage. La liste des vaccins est non exhaustive.

#### PIÈCE(S) JOINTE(S):

 [HPCI W\\_FT\\_vaccination résident.pdf](https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/prevention/HPCI_W_FT_vaccination%20r%C3%A9sident.pdf)  
([https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/prevention/HPCI\\_W\\_FT\\_vaccination%20r%C3%A9sident.pdf](https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/prevention/HPCI_W_FT_vaccination%20r%C3%A9sident.pdf))

 [planvaccination\\_personnel.pdf](https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/prevention/planvaccination_personnel.pdf)  
([https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/prevention/planvaccination\\_personnel.pdf](https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/prevention/planvaccination_personnel.pdf))

---

Dernière mise à jour le 02/10/2018