

BOP: MESURES ADDITIONNELLES GOUTTELETTES



L'objet de cette recommandation est d'éviter la transmission des germes véhiculés par gouttelettes. Les gouttelettes de sécrétions respiratoires ou de salive sont générées par la respiration, la toux, l'éternuement et la conversation. Ces mesures s'ajoutent aux Précautions Standard.

SITUATIONS NÉCESSITANT DES MESURES ADDITIONNELLES GOUTTELETTES

- Colonisation/infection du tractus respiratoire par des germes multirésistants :
- Durant la période épidémique patient avec symptômes de grippe (virus influenza)
- Autres : www.hpci.ch (<http://www.hpci.ch/>) - Mesures Additionnelles gouttelettes: liste indicative

DOMAINE D'APPLICATION

Bloc opératoire et salle de réveil. Le chirurgien doit mentionner le portage d'agents infectieux lors de la réservation de la salle.

DÉROULEMENT

- 1. Programmation** Afin d'atteindre les objectifs de cette recommandation, prévoir si possible le programme.
- 2. Général** Prévoir le personnel et le matériel nécessaires pour éviter des entrées et sortie
- 3. Ventilation** Pas de modification de la pression de la salle.
- 4. Portes** L'ouverture des portes doit être limitée au strict minimum.
Une affiche « Mesures Additionnelles gouttelettes » doit être placée sur la porte
- 5. Personnel** Le personnel attribué à une telle intervention ne devra pas s'occuper simultanément d'opérations se déroulant dans le bloc opératoire. Ceci concerne particulièrement le personnel de salle et le(a) tournant(e).

Mains Une désinfection des mains avec la solution hydro alcoolique est pratiquée après les opérations et lorsqu'on quitte la salle.

Gants Tout le personnel doit porter des gants pour tout contact avec des liquides biologiques. Lors de la manipulation de matériel potentiellement contaminé par les liquides biologiques, des nettoyages sont effectués.

Masque Tout le personnel présent dans la salle porte le masque chirurgical attaché. Le type IIR est recommandé

Blouse de protection Tout le personnel présent en salle d'opération porte une blouse de protection pour les nettoyages.

	Tenue	<u>Si souillures</u> , la tenue doit être changée au vestiaire après l'intervention.
6.	Matériel	Prévoir assez de matériel dans la salle pour l'intervention. <u>Dès la fin de l'intervention</u> , évacuer l'instrumentation souillée dans un bac fermé.
	Matériel mobile	Nettoyage minutieux de tout le matériel mobile ne pouvant être évacués de la salle (table roulante, etc...). Regrouper le matériel mobile au centre de la pièce. cf. FT traitement du matériel d'anesthésie, à l'exception de : <ul style="list-style-type: none">• Circuit respiratoire patient à à jeter• Tuyau de ventilation à à jeter• Ballon de ventilation à à décontaminer + stériliser• Tuyau de prélèvement spirométrie et tuyau CO² D-lite à à jeter• Bac à chaux sodé à décontaminer et stériliser ou utiliser un bac à usage unique• Circuit respiratoire interne, tuyau de retour de gaz, filtre respiratoire à à décontaminer + stériliser• Soufflet et bloc noir à à décontaminer et stériliser
	Matériel d'anesthésie	Nettoyage minutieux du chariot d'anesthésie.
7	Environnement	
	Déchets	Fermer les collecteurs d'objets tranchants si pleins aux 2/3 et les évacuer selon la procédure. Les déchets seront triés et évacués selon la directive institutionnelle.
	Linge	Le linge opératoire est placé dans un sac hermétique « filière linge infectieux ». Fermer les sacs à linge et les évacuer à l'extérieur de la salle en respectant les consignes. L'extérieur du sac est désinfecté avec de l'éthanol à 70% s'il présente des souillures.
	Sol	Nettoyer les souillures visibles entre 2 interventions avec un désinfectant détergent. Nettoyer toute la surface de la salle en fin de programme avec un désinfectant détergent.
	Murs	Nettoyer uniquement les souillures visibles. La salle d'induction sera traitée selon la même procédure.
8	Salle de réveil	Réutilisation de la salle dès que le sol est <u>entièrement sec</u>. Si possible pas de séjour en salle de réveil. Si séjour en salle de réveil, prévoir d'appliquer les <u>Mesures Additionnelles gouttelettes en respectant une distance recommandée entre chaque lit.</u>

PIÈCE(S) JOINTE(S):

Dernière mise à jour le 21/10/2016