

# COVID-19 - EMS/ESE/EPSP/CMS - MODALITÉS D'UTILISATION DES TESTS ANTIGÉNIQUES CHEZ LE PERSONNEL SOIGNANT SYMPTOMATIQUE

Afin de remédier à l'absentéisme du personnel présentant des symptômes compatibles avec CoVID-19, des tests antigéniques rapides sont disponibles des structures souhaitant en faire l'acquisition.

## 1. Indication à l'utilisation des tests antigéniques (MAJ 03-09-2021)

Ces tests antigéniques rapides **sont réservés au personnel soignant symptomatique non vacciné et présentant des symptômes depuis < 5 jours.**

Cette indication peut s'étendre aux professionnels prodiguant des soins de base (aide à la toilette, aux repas, à la mobilisation).

**L'utilisation des auto-tests est proscrite dans le cadre professionnel. Tout test antigénique positif doit être confirmé par un test PCR.**

**Pour le personnel vacciné symptomatique,** utiliser des tests PCR (frottis naso-pharyngé ou tests salivaires par frottis ou crachat) ([https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/20201102\\_Fiche\\_d-information\\_Coronavirus%E2%80%93Prise-en-charge\\_de%20l-analyse\\_et\\_des\\_prestations\\_medicales%20%283%29.pdf](https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/20201102_Fiche_d-information_Coronavirus%E2%80%93Prise-en-charge_de%20l-analyse_et_des_prestations_medicales%20%283%29.pdf)).

## 2. Technique

### Prélèvement naso-pharyngé selon la technique des tests par PCR :

- La personne qui fait cet examen doit porter l'équipement de protection individuel : masque de soins, surblouse, gants et lunettes de protection
  - Voir la fiche technique ([https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/prevention/Technique\\_de\\_pr%C3%A9l%C3%A8vement\\_naso-pharynge.pdf](https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/prevention/Technique_de_pr%C3%A9l%C3%A8vement_naso-pharynge.pdf))
  - Voir la vidéo (<https://www.youtube.com/watch?v=DVJNWefmHjE>)

### Utilisation du test antigénique rapide :

- Cet examen est un geste médical délégué et doit être effectué par une personne dûment formée.
  - Voir la vidéo de la technique de prélèvement et de lecture, réalisé par Unisanté (<https://youtu.be/mSAmgj61w2Q>)

## 3. Résultat du test antigénique

### → Positif

- Après un frottis naso-pharyngé pour test PCR de confirmation, la personne avec un test antigénique positif est renvoyée à domicile en isolement avec les consignes d'isolement (dépliant isolement ([https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/depliant\\_isolement\\_covid-19\\_fr\\_lire.pdf](https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/depliant_isolement_covid-19_fr_lire.pdf))). La durée de l'isolement est de 10 jours et 48 heures sans symptômes.
- déclaration (voir pt 4)

### → Négatif

- Faire un test par PCR à adresser à votre laboratoire
- Dans l'attente du résultat du test PCR, le personnel soignant pauci-symptomatique (pas de toux

importante ou écoulement nasal important) peut poursuivre son activité professionnelle. En cas d'aggravation des symptômes, arrêt de l'activité professionnelle et mise en isolement à domicile jusqu'à réception du résultat du test PCR.

Plus d'informations sur les tests antigéniques rapide, voir sur Unisanté. (<https://www.unisante.ch/fr/tests-rapides>)

#### 4. Déclaration des tests antigéniques

Tous les résultats de tests antigéniques rapides (positifs et négatifs) sont à déclarer sur le site **CoFast d'Unisanté**. Ce site permet de faire des déclarations plus rapides en français et transmet les résultats à l'OFSP.

#### Comment faire ?

1. **Remplissez d'abord le formulaire : Demander un accès (<http://cofast.unisante.ch/new-account>)**  
La demande est d'abord analysée par la DGS. Les comptes validés sont confirmés par l'envoi d'un email pour finaliser l'ajout du mot de passe.
2. Une fois en possession de  **votre identifiant CoFast activé, faites vos déclarations ici : [Cofast.unisante.ch \(https://cofast.unisante.ch/\)](https://cofast.unisante.ch/)**

Pour la déclaration à l'OFSP et au médecin cantonal, voir dans les [Recommandations générales \(https://www.hpci.ch/prevention/recommandations/contenu/n-cov-prise-en-charge-dun-patient-suspect-dinfection-%C3%A0#\)](https://www.hpci.ch/prevention/recommandations/contenu/n-cov-prise-en-charge-dun-patient-suspect-dinfection-%C3%A0#).

#### Voir également :

- [Recommandations générales CoVID-19 \(https://www.hpci.ch/prevention/recommandations/contenu/n-cov-prise-en-charge-dun-patient-suspect-dinfection-%C3%A0\)](https://www.hpci.ch/prevention/recommandations/contenu/n-cov-prise-en-charge-dun-patient-suspect-dinfection-%C3%A0)
- [Recommandation CoVID-19 pour EMS/EPsm/ESE/CAT \(https://www.hpci.ch/prevention/recommandations/contenu/covid-19-ems-epsm-ese-cat-prise-en-charge-dun-r%C3%A9sident-covid-19\)](https://www.hpci.ch/prevention/recommandations/contenu/covid-19-ems-epsm-ese-cat-prise-en-charge-dun-r%C3%A9sident-covid-19)

#### Dépliants :

- [Dépliant - Isolement CoVID-19 \(à lire en ligne\) \(https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/depliant\\_isolement\\_covid-19\\_fr\\_lire.pdf\)](https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/depliant_isolement_covid-19_fr_lire.pdf)
- [Dépliant - Isolement CoVID-19 \(à imprimer\) \(https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/depliant\\_isolement\\_covid-19\\_fr\\_imprimer.pdf\)](https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/depliant_isolement_covid-19_fr_imprimer.pdf)

#### Microorganismes et pathologies:

Nouveau coronavirus COVID-19

Nouveau coronavirus COVID-19

Nouveau coronavirus COVID-19

Dernière mise à jour le 15/05/2023